



前立腺

カバジタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 前立腺がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ジェブタナ	25 mg/m ²	d1

ドセタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 前立腺がん

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m ²	d1

ドセタキセル+カルボプラチン

催吐リスク: 3

適応疾患: 前立腺がん(去勢療法抵抗性)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	4 AUC	d1
ドセタキセル	60 mg/m ²	d1

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面积】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん
 SCLC: 小細胞肺がん
 PD: 病勢進行