

薬品名	併用禁忌
アストフィリン	イノバン、エピクイック、ストメリンD、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノールS、プロタノールL、ボスミン
アトニン-O 5 単位	プロスタルモンE、プロスタルモンF
アドバフェロン注 射液1200	小柴胡湯
アドバフェロン注 射液1800	小柴胡湯
アベロックス錠 400mg	シベノール、クラスIA抗不整脈薬(キニジン、プロカインアミド等)、クラスIII抗不整脈薬(アミオダロン、ソタロール等)
アミサリン注 [100mg]	アンカロン注150
アモキサシカプ セル25mg	エフピー、メレルル
アンカロン注150	リトナビル(ノービア)、サキナビル(フォートベイス)、メシル酸サキナビル(インビラーゼ)、硫酸インジナビルエタノール付加物(クリキシバン)、メシル酸ネルフィナビル(ビラセプト)、クラスIa抗不整脈薬;プロカインアミド、キニジン等、クラスIII抗不整脈薬:ソタロール(ソタコール)、ニフェカレント(シンビット)、ベプリジル(ベプリコール)、エリスロマイシン(注射用エリスロシン)、ペンタミジン(ベナンボックス)、スパルフロキサシン(スパラ)、塩酸モキシフロキサシン(アベロックス)
アムビゾーム点 滴静注用50mg	白血球輸注
イトリゾールカプ セル50	ハルシオン、硫酸キニジン、オーラップ、ベプリコール、リポバス、カルブロック、バイミカード、カフェルゴット、ジヒデルゴット、レビトラ
イトリゾール注 1%[200mg]	ピモジド、キニジン、ベプリジル、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼルニジピン、ニソルジピン、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、バルデナフィル
イノバン0.3% 注シリンジ	アストフィリン、アロテック吸入、エフェドリン注、ストメリンD、ドプス、プロタノールS、プロタノールL、ホクナリン
イミグラン注3	エフピー、カフェルゴット、ジヒデルゴット、ゾーミッグ、マクサルト、メテナリン、メテルギン
イムノブラダー 膀胱注用	抗癌療法(例えば細胞傷害性薬剤療法、放射線照射)、免疫抑制量のステロイド剤、免疫抑制剤
イムラン錠[50 mg]	麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン
リリテカン塩酸塩 点滴静注液	アタザナビル硫酸塩
リリテカン塩酸塩 点滴静注液	アタザナビル硫酸塩
インクレミンシ ロップ	タンニン酸アルブミン
インデラル錠10 mg	マクサルト、メレルル
インデラル注射 液2mg	マクサルト、メレルル、ワソラン注

薬品名	併用禁忌
イントロンA注射用300	小柴胡湯
イントロンA注射用600	小柴胡湯
イントロンA注射用1000	小柴胡湯
ウィンタミン錠12.5mg	エピクイック、ボスミン
ウブレチド錠[5mg]	サクシン
エースコール錠2mg	デキストラン硫酸セルロースを用いた吸着器によるアフエーシスの施行、アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜(AN69(R))を用いた透析
エストラサイトカプセル	カルシウム製剤
エストラーナテープ0.72mg	ヒスロンH
エフェドリン注射液「カイ」	イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノールS、プロタノールL、ボスミン
エプピーOD錠2.5	アナフラニール、アモキサシ、イミグラン、オピスタン、サノレックス、スルモンチール、ゾーミグ、テシプール、テトラミド、トリプタノール、トレドミン、パキシル、メジコン、ルボックス、ルジオミール
エリスロシン錠200mg	ダラシン
塩カル注「オーツカ」20mL	ジギトキシン、ジゴキシン(ハーフジゴキシン)、ジギラノゲンC、ラニラピッド、エストラサイト
おたふくかぜワクチン(乾燥弱毒)	副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオオーラル等
オバホルモンテープ5mg	ヒスロンH
オルガドロン注射液1.9mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
オルガドロン注射液3.8mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
カルチコール注射液8.5%[5mL]	(臨)エストラサイト、ジギトキシン、ジゴキシン(ハーフジゴキシン)、ジギラノゲンC、ラニラピッド
グラケーカプセル15mg	ワーファリン
クラシエ小柴胡湯エキス細粒	INF α 、INF β 、アドバフェロン、イントロンA、キャンフェロン、スミフェロン、フェロン、ペガシス
クレストール錠2.5mg	サンディミュン、ネオオーラル
クレストール錠5mg	サンディミュン、ネオオーラル
コートリル錠[10mg]	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
コートン錠25mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH

薬品名	併用禁忌
コバシル錠4mg	デキストラン硫酸セルロースを用いた吸着器によるアフェレーシスの施行、アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜(AN69(R))を用いた透析
コントミン注[25mg]	エピクイック、ボスミン
シアナマイド液「Wf」	ジギラノゲンC、薬用酒等
ジェムザール注射用200mg	胸部放射線照射
ジェムザール注射用1g	胸部放射線照射
ジギトキシン錠0.1mg	カルチコール、塩カル注、メディジェクトCa、サクシン
ジギラノゲンC注射液2mL	カルチコール、塩カル注、メディジェクトCa、サクシン、(臨)シアナマイド液
ジヒデルゴット[1mg]	イミグラン、ゾーミック
ジフルカンカプセル100mg	ハルシオン
シプロフロキサシンDU点滴静注	ケトプロフェン、テルネリン
シベノール錠50mg	レビトラ、アベロックス、フェアストーン
シベノール注射液70mg	レビトラ、アベロックス、フェアストーン
シンビット静注用50mg	アンカロン注150
水溶性プレドニン10mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
水溶性プレドニン20mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
水溶性プレドニン50mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
スミフェロン300	小柴胡湯
スミフェロン600	小柴胡湯
精製ツベルクリン一般診断用	副腎皮質ホルモン剤
セララ錠50mg	カリウム製剤、カリウム保持性利尿薬
セレスタミン錠	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
セレネース錠0.75mg	エピクイック、ボスミン
セレネース錠1.5mg	エピクイック、ボスミン
セレネース細粒1%	エピクイック、ボスミン

薬品名	併用禁忌
セレネース液 (2mg/ml)	エピクイック、ボスミン
セレネース注射 液[5mg]	エピクイック、ボスミン
ゼローダ錠300	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(ティーエス ワン)
ゾーミグRM錠 2.5mg	イミグラン、エフピー、カフェルゴット、ジヒデルゴット、マクサル ト、メテナリン、メテルギン
ソルコーテフ 100	ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH
ソルコーテフ 500	ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH
ソルメドロール 40	ワクチン 精製ツベルクリン、ヒスロンH
ソルメドロール 125	ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH
ソルメドロール 500	ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH
ソルメドロール 1000	ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH
ダイアート錠 [30mg]	ノルアドレナリン
タココンブ (4.8cm x4.8cm)	トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン
タココンブ(9.5cm x4.8cmレギュラーサ	トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン
ダラシンS注 600mg	エリスロシン
チガソンカプセ ル10	ビタミンA
ティーエスワン カプセル20	5-FU、ユーエフティ、フルツロン、アイソボリン
ティーエスワン カプセル25	5-FU、ユーエフティ、フルツロン、アイソボリン
デカドロン錠	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロ ンH
デシプール錠[1 mg]	エフピー
テトラミド錠10 mg	エフピー
デパケン錠100 mg	カルベニン
デパケン錠200 mg	カルベニン
デパケン細粒 40%	カルベニン
デパケンシロッ プ5%	カルベニン
デパケンR錠 200	カルベニン

薬品名	併用禁忌
デュファストン [5mg]	ヒスロンH
テルネリン錠1 mg	シプロキサ
ドプスカプセル 100	イノバン、エピクイック、セボフレ、ドミニン、ノルアドレナリン、 フォーレン、プロタノールS、プロタノールL、ボスミン
ドラール錠15	食物
ドラール錠20	食物
トランサミン錠 [250mg]	トロンビン、ボルヒール、タココンブ
トランサミン注5% [250mg]	トロンビン、ボルヒール、タココンブ
トランサミン注 10%[1000mg]	トロンビン、ボルヒール、タココンブ
トリプタノール錠 10mg	エフピー
トリプタノール錠 25mg	エフピー
トレドミン錠15	エフピー
トレドミン錠25	エフピー
トロンビン細粒[経 口](5千u/包)	レプチラーゼ、トランサミン、ボルヒール、タココンブ
トロンビン液ソフ トボトル5千単位	レプチラーゼ、トランサミン、ボルヒール、タココンブ
トロンビン液ソフ トボトル1万単位	レプチラーゼ、トランサミン、ボルヒール、タココンブ
ネオーラルカプ セル10mg	生ワクチン
ネオーラルカプ セル25mg	生ワクチン
ネオーラルカプ セル50mg	生ワクチン
ノアルテンD錠	ヒスロンH
ノバミン錠5mg	エピクイック、ボスミン
パキシル錠 10mg	エフピー、メレリル
パキシル錠 20mg	エフピー、メレリル
パクリタキセル 注30mg/5mL	ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸 塩
パクリタキセル 注	ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸 塩
パーセリン錠25	ヒスロンH

薬品名	併用禁忌
ハーブジゴキシンKY錠0.125mg	カルチコール、塩カル注、メディジェクトCa、サクシン
BCGワクチン(乾燥)	副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオーラル等
ヒスロンH200	黄体ホルモン、卵胞ホルモン、副腎皮質ホルモン
ヒルナミン錠5mg	エピクイック、ボスミン
ヒルナミン錠25mg	エピクイック、ボスミン
5-FU協和[250mg]	TS-1及びTS-1中止後7日内の投与
ファンギゾン[50mg]	白血球輸注中又は直後に本剤を投与
バイフェンド錠50mg	リファジン、ミコブティン、ストックリン、ノービア、カレトラ、テグレトール、バルビタール、フェノバルビタール、オーラップ、硫酸キニジン、エルゴタミン、ハルシオン
バイフェンド錠200mg	リファジン、ミコブティン、ストックリン、ノービア、カレトラ、テグレトール、バルビタール、フェノバルビタール、オーラップ、硫酸キニジン、エルゴタミン、ハルシオン
風しんワクチン(乾燥弱毒生)	副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオーラル等
フェルムカプセル	タンニン酸アルブミン
フェロミア錠50mg	タンニン酸アルブミン
フェロン300	小柴胡湯
フェロン600	小柴胡湯
プリモジアンデポー	ヒスロンH
ブレオ注射用5mg	胸部及びその周辺部への放射線照射
ブレオ注射用15mg	胸部及びその周辺部への放射線照射
ブレオ注射用30mg	胸部及びその周辺部への放射線照射
プレドニン錠5mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
プレマリン錠0.625mg	ヒスロンH
プロゲデポー125mg	ヒスロンH
プロジフ静注液100	ハルシオン
プロジフ静注液200	ハルシオン

薬品名	併用禁忌
プロジフ静注液 400	ハルシオン
プロスタール錠 25	ヒスロンH
プロスタグランジンE2 錠0.5mg「科研」	アトニン-O、プロスタルモンF
プロスタルモン・ F注射液1000	アトニン-O、プロスタルモンE
プロタノールS 錠[15mg]	アストフィリン、アロテック、イノバン、エピクイック、エフェドリン、 ストメリン、ドプス、ドミニン、ノルアドレナリン、ベロテック、ボス ミン、ホクナリン
プロタノールL注 [0.2mg]	イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、ホクナリン、 ボスミン
プロベラ[2.5 mg]	ヒスロンH
ペガシス皮下注 90 μ g	小柴胡湯
ペグイントロン 50 μ g	小柴胡湯
ペグイントロン 100 μ g	小柴胡湯
ペグイントロン 150 μ g	小柴胡湯
ベゲタミンA錠	エピクイック、ボスミン
ベゲタミンB錠	エピクイック、ボスミン
ベザトールSR 錠[200mg]	(原則禁忌)メバロチン、リピトール
ベサノイドカプセル [10mg]	ビタミンA
ホクナリンテー プ0.5mg	イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノール S、プロタノールL、ボスミン
ホクナリンテー プ2mg	イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノール S、プロタノールL、ボスミン
ボスミン注[1m g]	インプロメン、ウインタミン、カルデナリン、クロフェクトン、コントミン、ジプレキサ、セホ フレン、セレネース、セロクエル、ノバミン、ヒルナミン、フォーレン、プロタノールS、プロ タノールL、ベゲタミンA、ベゲタミンB、ホクナリン、メレリル、リスパダール
ボスミン液0. 1%	インプロメン、ウインタミン、カルデナリン、クロフェクトン、コントミン、ジプレキサ、セホ フレン、セレネース、セロクエル、ノバミン、ヒルナミン、フォーレン、プロタノールS、プロ タノールL、ベゲタミンA、ベゲタミンB、ホクナリン、メレリル、リスパダール
ホーリン錠1mg	ヒスロンH
ホーリンV錠[1 mg]	ヒスロンH
ボルヒール1m L	トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン
ボルヒール3m L	トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン

薬品名	併用禁忌
マイリス膈坐剤 [600mg]	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
マクサルトRPD錠10mg	イミグラン、インデラル、エフピー、カフェルゴット、ジヒデルゴット、ゾーミック、メテナリン、メテルギン
麻しんワクチン (乾燥弱毒生)	副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオーラル等
メジコン錠15mg	エフピー
メジコン散 (100mg/g)	エフピー
メジコンシロップ	エフピー
メテナリン[0.2mg]	イミグラン、ゾーミック
メテルギン錠 [0.125mg]	イミグラン、ゾーミック
メドロール錠[4mg]	ワクチン 精製ツベルクリン、ヒスロンH
メバロチン錠5	(原則禁忌)ベザトールSR
メバロチン錠10	(原則禁忌)ベザトールSR
メロペン点滴用 0.5g	デパケン
ユーエフティ	TS-1及びTS-1中止後7日内の投与
ユーエフティーE 腸溶顆粒 100	TS-1及びTS-1中止後7日内の投与
ユーエフティーE 腸溶顆粒 200	TS-1及びTS-1中止後7日内の投与
ラニラピッド錠 0.1mg	サクシン、塩カル注、メディJECTCa、カルチコール
リスパダール錠 1mg	エピクイック、ボスミン
リドーラ錠[3mg]	(臨)メタルカプターゼ200
リメタゾン静注 2.5mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
硫酸キニジン錠 100mg	イトリゾール、フロリード、メレルル、アンカロン注150、ポリコナゾール(ブイフェンド)
リンデロン錠 [0.5mg]	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
リンデロン散 (1mg/g)	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
リンデロンシロップ (0.1mg/mL)	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
リンデロン注2mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH

薬品名	併用禁忌
リンデロン注4mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
リンデロン注20mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
リンデロン懸濁注[2.5mg]	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
リンデロン坐剤0.5mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
リンデロン坐剤1mg	精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH
ルジオミール錠10mg	エフピー
ルジオミール錠25mg	エフピー
ルボックス錠25	エフピー、メレリル
ルボックス錠50	エフピー、メレリル
レプチラーゼS注[2mL]	トロンビン、ボルヒール、タココンブ
レボホリナート25mg注「NP」	TS-1及びTS-1中止後7日内の投与
ロイコボリン錠25mg(ユーゼル)	TS-1及びTS-1中止後7日内の投与
ワゴスチグミン散0.5%	サクシン
ワソラン注[5mg]	インデラル注
ワーファリン錠1mg	グラケー