

薬効別一覧

111全身麻酔剤		用法用量	備考	単	薬価
注	ケタラール静注用200mg	(V)	3.5-5.5	瓶	722.00
	ドロレプタン注射液25mg	添付文書参照	2.5-4.5	mL	131.00
	1%プロポフォール注 200mg 20mL	(V)	6.0-8.5	本	1030.00
	1%プロポフォール注 500mg 50mL	(V)	6.0-8.5	瓶	1505.00
	ラボナール[500mg]	(M、V、直腸)	10±0.5	本	1122.00
外	セボフレン	添付文書参照			
	フォーレン(250mL)	添付文書参照			

112抗不安剤		用法用量	備考	単	薬価
内	エリスパン錠0.25	3T分3	粉△光	T	9.10
	グランダキシン錠50mg	3T分3	粉○	T	17.10
	セディール錠5	6T分3	粉×	T	20.00
	セルシン錠2mg	添付文書参照	粉○	T	5.90
	セルシン錠5mg	添付文書参照	粉○	T	9.20
	ソラナックス0.4mg錠	3T分3	粉△	T	10.10
	マイスリー錠5mg	1-2T分1	粉△遮光4	T	49.60
	マイスリー錠10mg	0.5-1T分1	粉△遮光4	T	78.70
	メイラックス錠1mg	2T分1-2	粉△湿	T	23.80
	レキソタン錠2	添付文書参照	粉○	T	6.60
	レキソタン錠5	添付文書参照	粉○	T	15.50
	レスミット錠5	2-6T	粉○	T	5.70
注	セルシン注射液5mg	初回10mg(M、V)	6.0-7.0	本	69.00
外	ダイアアップ坐剤4mg	0.4-1mg/kg/日		個	63.10
	ダイアアップ坐剤6mg	0.4-1mg/kg/日		個	72.20
	ダイアアップ坐剤10mg	0.4-1mg/kg/日		個	84.90

116抗パーキンソン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ビ・シフロール錠0.125mg			T	54.20
	ビ・シフロール錠0.5mg			T	186.00
	レキップ錠0.25mg	Max15mg/日		T	56.80

薬効別一覧

112催眠鎮静剤		用法用量	備考	単	薬価	
内	アモバン錠10	1T眠前	粉△苦み	T	31.50	
	ドラール錠15	2T迄	粉○	T	110.90	
	ドラール錠20	1.5T迄	粉○	T	131.50	
	トリクロリールシロップ(100mg/mL)	10-20mL		mL	12.10	
	フェノバル10倍散	0.3-2g分1-4		g	9.00	
	ベンザリン錠[5mg]	1-2T眠前	粉○	T	11.80	
	ユーロジン1mg錠	2-8T眠前	粉△苦み	T	11.00	
	ユーロジン2mg錠	1-4T眠前	粉△苦み	T	17.20	
	レンドルミンD錠0.25mg	1T眠前		T	29.40	
	ロヒプノール錠1	0.5-2T眠前	粉○	T	15.60	
	ロヒプノール錠2	0.25-1T眠前	粉○	T	23.10	
	ロラメット錠1.0	1-2T眠前	粉△4W内	T	23.50	
	注	ドルミカム注[10mg]	(M, V)	2.8-3.8	A	147.00
		フェノバル注射液10%[100mg]	0.5-4A(C, M)	7.8-8.8	A	77.00
プレデックス静注液200μg「ホスピール」		6→0.2~0.7μg/k		瓶	5077.00	
ロヒプノール静注用[2mg]		(V)	3.5-5.5	A	150.00	
外	ワコビタール坐剤50mg	小児4-7mg/kg		個	59.30	
	ワコビタール坐剤100mg	小児4-7mg/kg		個	73.90	

薬効別一覧

113抗てんかん剤	用法用量	備考	単	薬価
内 アレビアチン散10%	2-3g分3		g	12.40
アレビアチン錠[100mg]	2-3T分3	粉○	T	13.40
イーケプラ錠500mg	2T分2 Max6T/日		T	230.80
エクセグラン散(200mg/g)	最大3g		g	66.10
エクセグラン錠100mg	最大6T	粉○	T	35.80
ガバペン錠300mg	極量2400mg		T	51.40
テグレトール錠[200mg]	1-2T→3T	粉○	T	13.30
デパケン錠100mg	4-12T分2-3	粉×	T	10.70
デパケン錠200mg	2-6T分2-3	粉×	T	16.20
デパケン細粒40%	1-3g分2-3		g	27.10
デパケンシロップ5%	8-24mL分2-3		mL	8.40
デパケンR錠200	2-6T分1-2	粉×	T	20.70
リボトリール錠0.5mg	添付文書参照	粉○	T	9.50
リボトリール錠1mg	添付文書参照	粉○	T	16.40
注 アレビアチン注射液[250mg]	1回0.5-1A(V)	12.0	本	137.00

薬効別一覧

114解熱鎮痛消炎剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アスピリン	1-4.5g分2-3		g	1.98
	カロナール細粒[20%](200mg/g)	1日4.5-7.5g		g	9.10
	カロナール錠200mg	1.5-5T/日 Max20		T	9.00
	カロナール細粒50%	300~1000mg/日		g	10.70
	セレコックス錠100mg	2T分2		T	79.00
	ソランタール錠100mg	3T分3	粉△苦み	T	13.80
	トラマールカプセル25mg	4-12T分4 Max16			
	トラムセット配合錠	4T分4(Max8錠)		T	68.20
	ノイロトロピン錠	4T分2	粉×	T	34.50
	ハイペン錠200mg	2T分2	粉△苦み	T	31.60
	パラミデнкаプセル300mg	添付文書参照	粉○苦み	C	17.40
	ボルタレン錠[25mg]	3-4T(屯)1-2T	粉○	T	14.40
	モーバー錠100mg	3T分3	粉○	T	80.00
	モービック錠5mg	1C分1	粉○	T	42.20
	モービック錠10mg	1C分1	粉○	T	64.70
	ロキソニン錠[60mg]	3T分3	粉○	T	20.30
注	サルソニン注射液[500mg]	(V)	5.0-6.5	A	59.00
	ソセゴン注射液15mg	(C、M、V)	3.5-5.5	本	73.00
	トラマール注100	(M)		A	104.00
	ノイロトロピン注射液3.6単位3ml	(C、M、V)	7.0-8.0	A	172.00
	メチロン注25%2mL	1回0.5A	5.0-8.5	本	95.00
	ロピオン注	(V)	4.5-6.5	A	251.00
外	アルピニー坐剤100mg	1日1回		個	20.10
	アルピニー坐剤200mg	1日1回		個	32.30
	ボルタレンサポ12.5mg	2-4個 1日1-2回		個	49.30
	ボルタレンサポ25mg	1-2個 1日1-2回		個	57.90
	ボルタレンサポ50mg	0.5-1個 1-2回		個	71.00
	レペタン坐剤0.2mg	癌:1-2個/8-12H		個	181.60
	レペタン坐剤0.4mg	0.5-1個/8-12H		個	239.90
	ロキソニンテープ50mg	1日1回		枚	30.60

薬効別一覧

116抗パーキンソン剤	用法用量	備考	単	薬価
内 アキネトン錠[1mg]	2T分2→3-6T	粉○	T	5.60
アーテン錠2mg	1-5T分3-4	粉△苦み	T	8.60
イーシー・ドパール錠	添付文書参照	粉△吸湿	T	35.10
エフピーOD錠2.5	維持:3T		T	332.70
カバサール錠1.0mg	維持:2-4T 粉×	アルミ袋で○	T	305.70
シンメトレル錠50mg	添付文書参照	粉×	T	32.40
シンメトレル細粒(100mg/g)	1日1-3g分1-3		g	61.90
ドブスカプセル100	1C→6C分3	粉○	C	79.20
ネオドパストン錠100mg	1-3T→6-7.5T	粉○湿4W	T	38.70
ネオドパストン錠250mg	維持3T	粉○湿4W	T	97.40
パーロデル2.5mg	添付文書参照	粉△変色	T	123.90
ペルマックス錠50μg	添付文書参照	粉×	T	56.40
ペルマックス錠250μg	添付文書参照	粉×	T	236.10
注 アキネトン注射液[5mg]	1-2A(M)	4.5-5.5	A	59.00

薬効別一覧

117精神神経用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アタラックスPカプセル25mg	1-6C分2-4	粉△苦み	C	7.00
	アモキサンカプセル25mg	1-3C 分1-数回	粉△臭い	C	14.70
	ウインタミン錠12.5mg	添付文書参照	粉×苦光	T	9.20
	セレネース錠0.75mg	初め1-3T	粉○	T	7.80
	セレネース錠1.5mg	初め0.5-1.5T	粉○	T	9.40
	セレネース細粒1%	外 添付文書参照		g	51.30
	セレネース液(2mg/ml)			mL	23.00
	テシプール錠[1mg]	3T分3	粉△2W内	T	17.90
	テトラミド錠10mg	3T→6T分1	粉○	T	17.20
	デパス錠0.5mg	3-6T分3	粉○	T	9.00
	デパス錠1mg	1.5-3T分3	粉○	T	14.20
	ドグマチール錠100mg	3-6T	粉△4W内	T	20.40
	トリプタノール錠10mg	30-75→150mg	粉×苦マヒ	T	9.60
	トリプタノール錠25mg	30-75→150mg	粉×苦マヒ	T	9.60
	トレドミン錠15	1日3-6T	粉○2W内	T	26.50
	トレドミン錠25	1日2-4T	粉○2W内	T	39.10
	ノバミン錠5mg	1-4T	粉○	T	9.60
	パキシル錠10mg	2-4T分1(維持量)	粉△苦	T	114.80
	パキシル錠20mg	1-2T分1(維持量)	粉△苦	T	201.30
	ヒルナミン錠5mg	5-40T	粉△光	T	5.70
	ヒルナミン錠25mg	1-8T	粉△光	T	5.70
	ベゲタミンA錠	3-4T	粉×刺激	T	8.20
	ベゲタミンB錠	3-4T	粉×刺激	T	6.50
注	ノバミン筋注5mg	(M)1日1回1A	5.0-6.0	A	62.00

薬効別一覧

117精神神経用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	リスパダール錠1mg	維持:2-8T分2	粉×苦み	T	37.30
	リスパダール内用液0.5mg/0.5mL			mL	109.10
	リーゼ錠5mg	3-6T分3	粉○	T	7.30
	リーマス200	維持:1-4T	粉×刺激	T	22.60
	ルジオミール錠10mg	30-75mg分2-3	粉×舌マヒ	T	14.10
	ルジオミール錠25mg	30-75mg分2-3	粉×舌マヒ	T	29.00
	ルボックス錠25	2T→6T 分2	粉×シレ	T	42.30
	ルボックス錠50	1T→3T 分2	粉×シレ	T	73.60
	レスリン錠25	3-4T分1-数	粉△苦み	T	20.20
	レスリン錠50	1.5-2T分1-数	粉△苦み	T	35.60
注	アタラックスP注射液25mg	(M、V、D)	3.0-5.0	本	58.00
	アタラックスP注射液50mg	(M、V、D)	3.0-5.0	本	65.00
	コントミン注[25mg]	1回0.4-2A(M)	4.0-6.5	A	93.00
	セレネース注射液[5mg]	1-2A(M、V)	3.5-4.2	本	96.00

118総合感冒剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ピーエイ錠	8T分4		T	4.60

薬効別一覧

119その他の中枢神経系用薬		用法用量	備考	単	薬価
内	アリセプトD錠3mg	添付文書参照		T	286.50
	アリセプトD錠5mg	添付文書参照		T	427.50
	グラマリール錠25mg	3-6T分3	粉△苦み	T	27.80
	セレジスト錠5	2T分2	粉○	T	1178.90
	テルロン錠0.5	有 2T分2		T	149.60
	メマリー錠10mg	5mgより開始 維		T	239.20
	リリカカプセル25mg	導入150mg分2以		C	100.50
	リリカカプセル75mg	導入150mg分2以		C	167.10
	レミッチカプセル2.5μg(透析のみ)	有 外 1C夕or眠前		C	1745.10
注	ラジカット注30mg	1回1A(D) 1日2回	3.0-4.5	本	8136.00
	ラジカット点滴静注バッグ30mg	1回1P(D) 1日2回	3.5-4.5	本	8136.00

121局所麻酔剤		用法用量	備考	単	薬価
内	キシロカインビスカス(100mL)	5-45mL分1-3		mL	6.10
注	アナペイン注2mg/mL(10mL)	添付文書参照	4.0-6.0	本	330.00
	アナペイン注2mg/mL(100mL)	添付文書参照	4.0-6.0	袋	1627.00
	アナペイン注7.5mg/mL(20mL)	添付文書参照	4.0-6.0	本	1106.00
	キシロカインシリンジ1%	添付文書参照	5.0-7.0	筒	284.00
	キシロカインシリンジ2%	添付文書参照	5.0-7.0	筒	235.00
	キシロカインポリアンプ0.5%(10mL)	添付文書参照	5.0-7.0	筒	104.00
	キシロカインポリアンプ1%(10mL)	添付文書参照	5.0-7.0	筒	113.00
	キシロカインポリアンプ2%(10mL)	添付文書参照	5.0-7.0	筒	163.00
	キシロカインE注射液1%(20mL)	添付文書参照	3.5-5.0	mL	11.30
	キシロカインE注射液2%(20mL)	添付文書参照	3.5-5.0	mL	16.80
	マーカイン注0.5%			mL	20.40
	マーカイン注脊麻用0.5%高比重(4mL)	1回2-4mL	4.0-6.0	本	438.00
	マーカイン注脊麻用0.5%等比重(4mL)	添付文書参照	5.0-6.5		
	ロカイン注1%(5mL)	キシロカイン不可のPt			94.00
外	キシロカイン液4%(100mL)	2-5mL		mL	13.80
	キシロカインポンプスプレー8%	1-5回		g	24.40
	キシロカインゼリー(30mL)	3-15mL		mL	8.30
	ユーパッチ	入		枚	37.40

薬効別一覧

122骨格筋弛緩剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ダントリウムカプセル25mg	1-6C 分1-3	服用時開	C	26.10
注	エスラックス静注50mg/5.0mL	添付文書参照			
	ダントリウム静注用[20mg]	添付文書参照	9.0-10.5	瓶	9629.00
	マスキュラックス静注用[10mg]	(V)	3.8-4.2	瓶	896.00

123自律神経剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ウブレチド錠[5mg]	1-4T分1-4	粉△吸湿	T	22.10
	トランコロン錠[7.5mg]	6T分3	粉△4W内	T	5.80
	ワゴスチグミン散0.5%	1-18g分1-3		g	16.60
注	オビソート注射用[100mg]	(C, M)		A	366.00

124鎮けい剤		用法用量	備考	単	薬価
内	コスパノンカプセル[40mg]	3-6C分3	粉△苦湿	C	9.00
	テルネリン錠1mg	3T分3 6-9T迄	粉○	T	18.90
	ブスコパン錠[10mg]	3-10T分3-5	粉△苦み	T	7.60
	ミオナール錠50mg	3T分3	粉△臭	T	21.20
注	アトロピン注0.1%シリンジ「テルモ」	(C, M)		筒	164.00
	塩酸パパベリン注射液	(C, M)	3.0-5.0	A	92.00
	ブスコパン注射液[20mg]	(C, M, V)	3.7-5.5	A	60.00
	注射用マグネゾール20ml	有 1A/回	3.5-6.5	A	358.00
	硫酸アトロピン注射液[0.5mg]	1回1A(C, M, V)	4.0-6.0	A	94.00
	硫酸Mg 補正液1mEq/mL		5.5~7.5		97.00

薬効別一覧

131眼科用剤	用法用量	備考	単	薬価
注 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	添付文書参照			
ビスコート 0.5mL	添付文書参照			
外 アイオピジン1%(0.1mL)	添付文書参照		個	703.50
アトロピン点眼液日点1%5mL	1-2滴 1日1-3回		瓶	97.40
エイゾプト1%点眼液	1日2回	7.5	mL	438.60
エコリシン眼軟膏(3.5g)	1日数回		g	35.10
エコリシン点眼液(5mL)	1回2-3滴/2-3H		mL	25.70
塩酸ベノキシネート点眼0.4%ミニムス	1-4滴/回		本	薬価未収載
オフサロン点眼液	1日4-5回		瓶	84.80
オペガードMA 20mL	添付文書参照			
オペガードMA 500mL	添付文書参照			
オペリード HV0.85眼粘弾剤1%			筒	7,319.70
ガチフロ0.3%点眼液	1滴 1日3回		mL	125.60
カリーユニ点眼液(5mL)	1-2滴 1日3-5回		瓶	63.70
クラビット点眼液(5mL)	1滴 1日3回		mL	138.10
コソプト配合点眼液	1日2回		mL	668.00
コンドロン点眼液3% 5mL	1-2滴 1日2-4回		瓶	89.70
サイプレジン1%点眼液(10mL)	1日1回1滴		mL	88.10
ザラカム配合点眼液	1日1回		mL	1306.00
サンコバ点眼液 5mL	1-2滴 1日3-5回		瓶	97.20
サンテマイシン点眼液(5mL)	1-2滴 1日3-4回			
サンピロ2% 5mL	1-2滴 1日3-5回		瓶	162.20
ジクアス点眼液3%	1日6回		瓶	623.40
スコピゾル15(15mL)	角膜装着補助		本	薬価未収載
ゾビラックス眼軟膏(5g)	1日5回		g	641.10
タチオン【点眼液】5mL	1-2滴 1日3-5回		mL	24.60
タリビット眼軟膏(3.5g)	1日3回		g	129.90
タリムス点眼液0.1%	1日2回		瓶	9383.20
チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL)	1滴 1日1回		mL	806.90
デタントール0.01%点眼液(5mL)	1回1滴 2回/日		mL	306.50
デュオトラバ配合点眼液	1日1回		mL	1360.00
トラバタンズ点眼液0.004%	1日1回		mL	981.80
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1日3回ただし術前		mL	186.20
マキュエイド硝子体内注用40mg	添付文書参照			8,066.00

薬効別一覧

131眼科用剤		用法用量	備考	単	薬価
注	ルセンチス硝子体内注射液	添付文書参照		瓶	176,235.00
外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	1回1-2滴		mL	46.90
	ネオメドロールEE軟膏(3g)	1日1-数回		g	55.80
	パタノール点眼液0.1%	1日4回 1-2滴		mL	195.00
	ヒアレイン0.1 5mL	1滴 1日5-6回		瓶	475.90
	PA・ヨード液 0.2% 20mL			mL	22.20
	ピマリシン眼軟膏(5g)			g	615.30
	ピマリシン5%点眼液(5mL)			mL	649.40
	ヒーロン0.4mL	添付文書参照			
	フルメトン0.1%(5mL)	1-2滴 1日2-4回		mL	73.70
	ブロナック点眼液(5mL)	1日2回 1-2滴		mL	121.70
	ベストロン点眼用(5mL)	1-2滴 4回/日		mL	58.30
	マイティア「人工涙液」5mL	1-2滴 1日5-6回		瓶	84.80
	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	1日1回1-2滴		mL	23.80
	ミドリンP点眼液(10mL)	1回1-2滴×2回		mL	30.00
	リボスチン点眼液0.025%(5mL)	1日4回 1-2滴		mL	157.90
	リンデロンA液点眼・点鼻用(5mL)	1-2滴 1-数回		mL	85.20
	リンデロンA軟膏点眼・点鼻用(5g)	1-数回		g	73.00
	リンデロン液(1mg/ml)(5mL)	1-2滴 3-4回		mL	76.60
	ルミガン点眼液0.03%	1日1回(2回以上)		mL	935.10

薬効別一覧

132耳鼻科用剤		用法用量	備考	単	薬価
外	インタール点鼻液	1噴霧 1日6回		瓶	920.20
	ザジテン点鼻液 8mL	1日4回		瓶	867.20
	タリビット耳科用液(5mL)	6-10滴 1日2回		mL	126.40
	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	2-3滴 1日数回		mL	7.40
	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	各鼻腔2puff分1		瓶	1918.50
	ホスミンS耳科用(10mL)	10滴 1日2回		mL	97.80
	リノロサル液(100mL)	適量 1日1-数回		mL	26.10

133鎮暈剤		用法用量	備考	単	薬価
内	セフアドール錠[25mg]	3-6T分3	粉△苦み	T	14.50
	セロクラール錠20mg	3T分3	粉○	T	15.40
	トラベルミン錠	3-4T分3-4	粉△苦み	T	6.10
	メリスロン錠[6mg]	3-6T分3	粉○	T	8.50

薬効別一覧

21ACE阻害剤		用法用量	備考	単	薬価
内	エースコール錠2mg	0.5-2T分1	粉△吸湿	T	77.80
	コバシル錠4mg	0.5-1T分1	粉○	T	144.50
	ロンゲス錠10mg	0.5-2T分1	粉○	T	73.50

21ARB		用法用量	備考	単	薬価
内	オルメテック錠20mg		粉○	T	142.00
	ディオバン錠80mg	0.5-1T分1	粉○	T	125.30
	プロプレス錠8	0.5-1T 分1	粉○	T	150.30
	ミカルディス錠40mg	1T分1 2T迄		T	142.40

21Ca拮抗剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アダラート5mg	6C分3	粉×	C	14.80
	アダラートL錠20mg	1-2T分2	粉×光	T	32.20
	アテレック錠10	0.5-1T 分1	粉○要遮光	T	66.60
	カルブロック錠16mg	1T分1		T	70.60
	コニール錠4	0.5-2T分1-2	粉○	T	60.10
	セパミットR細粒(10mg/0.5g/包)	1-2g分2		g	41.20
	ニバジール錠2mg	2-4T分2	粉△吸湿	T	18.60
	ノルバスクOD錠2.5mg	0.5-1T分1	粉○	T	35.30
	ノルバスクOD錠5mg	0.5-1T分1	粉○	T	64.90
	ヘルベッサーRカプセル100	1-2C分1	粉×	C	49.40
	ワソラン錠[40mg]	3-6T分3	粉△湿	T	7.10
注	ニカルピン注2mL	(V, D)	3.0-4.5	A	92.00
	ニカルピン注10mL	(V, D)	3.0-4.5	A	268.00
	ヘルベッサー注射用50	(V, D)	5.5	瓶	1590.00
	ワソラン注[5mg]	1回1A(V)	4.5-6.5	A	297.00

薬効別一覧

21 α 1-ブロッカー		用法用量	備考	単	薬価
内	エブランチル15	2C分2	開封/可	C	19.40
	カルデナリン錠2mg	0.5-4T分1	粉○苦み	T	64.60

21 β -ブロッカー剤		用法用量	備考	単	薬価
内	インデラル錠10mg	3-12T分3	粉×苦光	T	16.00
	ケルロング錠10mg	0.5-1T分1	粉△苦み	T	143.50
	セロケン錠20mg	3-6T分2-3	粉△苦湿	T	16.70
	テノーミン25	2T分1	粉△苦湿	T	61.20
	テノーミン50	1T分1	粉△苦湿	T	103.30
	メインテート錠5	1T分1	粉○	T	140.60
注	インデラル注射液2mg	1-5A(V)	2.8-3.5	本	100.00
	注射用オノアクト50	添付文書参照		瓶	6486.00
	コアベータ静注用12.5mg	造影時			

21その他の血圧降下剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アーチスト錠2.5mg	1-5T分2	粉○	T	32.00
	アーチスト錠20mg	0.5-1T分1	粉○	T	145.80
	アプレゾリン散10%	0.3-2g分3-4		g	14.00
	アルマール10	2T分2	粉△1W	T	53.50
	ワイテンス錠[2mg]	2T分2 4T迄	粉△光湿	T	16.90
注	アプレゾリン注射用[20mg]	1回1A(M, V)	3.3-5.3	A	265.00

21合剤		用法用量	備考	単	薬価
内	コディオ配合錠EX	1日1回1錠		T	130.60
	ミコンビ配合錠BP	1日1回1錠		T	219.80
	ユニシア配合錠HD	1日1回1錠		T	150.30

21中枢性 α 2アゴニスト		用法用量	備考	単	薬価
内	アルドメット錠	有		T	9.60

薬効別一覧

21その他の循環器官用薬		用法用量	備考	単	薬価
内	カリエードプラス散(分包)96.7%	3-6p分2-3		g	15.70
	カリメート	15-30g分2-3		g	17.70
	サアミオン錠[5mg]	3T分3	粉△光	T	37.30
	テラナス錠5	2T分2 4T迄	粉○	T	32.60
	フォスブロック錠 250mg	12-24T分3		T	29.80
	ホスレノールチュアブル錠250mg	有 3T食直後 9T/日		T	194.10
	ユベランカプセル[100mg]	3-6C分3	粉△光	C	6.20
	リズミック錠10mg	2T分2	粉○	T	52.70
注	エリルS注[30mg]	2-3A 分2-3(D)	5.7-6.3	A	3250.00
	グリセオール注200mL	1日1-5V(D)	3.0-6.0	袋	303.00
	スロバスタン注10mg		5.2-7.2	A	1365.00
	タンデトロン注射用20	(V, A)	4.0-6.0	A	485.00
	ニコリン注射液500mg	(M, V, D)	6.5-8.0	本	475.00
	ニコリンH注射液[1000mg]	(V)	6.5-8.0	本	749.00
	パルクス注[5μg]	1-2A(V, D)	4.5-6.0	A	3389.00
	パルクス注[10μg]	0.5-1A(V, D)	4.5-6.0	本	5623.00
	プリンク注10μg	0.5-1A(V, D)	4.5-6.0	A	2141.00
	プロスタンディン注射用500	(D)	3.5-5.5	瓶	23079.00
	20%マンニトール注射液「YD」	1回5-15mL/kg(D)	4.5-7.0		

薬効別一覧

21強心剤	用法用量	備考	単	薬価
内 アカルディカプセル1.25	2-4C分2	粉△吸湿	C	102.10
エホチール錠[5mg]	3-6T分3	粉△苦光	T	9.20
ジギトキシン錠0.1mg	維持0.5-1T	粉△		
タナドール顆粒(750mg/g/包)	3g分3		g	491.20
ネオフィリン末	0.3-0.4g分3-4		g	12.90
ノイキノン錠10mg	3T分3	粉△変色	T	19.90
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	維持2-4T	粉○	T	9.60
プロタノールS錠[15mg]	3-4T分3-4	粉×	T	26.50
ラニラピッド錠0.1mg	維持:1-2T	粉○	T	10.50
注 アデール注5mg	0.5 μg/kg/分	4.3-4.6	瓶	4572.00
アデール注10mg	0.5 μg/kg/分	4.3-4.6	瓶	7770.00
イノバン0.3%注シリンジ 50mL	1-5 γ(D)	3.0-5.0	筒	1475.00
エホチール注射液[10mg]	0.2-1A(C, M, V)	5.5-6.5	A	60.00
ジギラノゲンC注射液2mL	(M, V)	5.0-7.0	A	95.00
ドブポン0.3%注シリンジ 50mL		3.0-4.0	筒	911.00
ネオフィリン注[250mg]	1-2A(V, D)	8.0-10.0	A	94.00
プロタノールL注[0.2mg]	(C, M, V, D)	4.0-5.0	A	248.00
ミルリーラ注射液10mg(10mL)	(V, D)	3.2-4.0	本	6348.00

薬効別一覧

21血管拡張剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アイトロール錠20mg	2-4T分2	粉○	T	17.50
	コメリアンコーワ錠100	0.5-3T分3	粉△苦み	T	20.50
	シグマート錠5mg	3T分3	粉△1W湿	T	26.30
	ズファジラン錠[10mg]	3-6T分3-4	粉○	T	8.90
	ニトロペン錠[0.3mg]	1-2T	粉×	T	15.10
	ニトロール錠[5mg]	3-8T分3-4	粉○	T	9.60
	ペルサンチン-Lカプセル[150mg]	2C分2	粉×	C	44.10
注	シグマート注2mg	(D)	5.6-8.1	瓶	362.00
	シグマート注48mg	(D)	5.6-8.1	瓶	5192.00
	ズファジラン注[5mg]	(M)	4.9-6.0	A	62.00
	ニトロール注5mg(10mL)	(D)	4.0-6.0	本	273.00
	ハンプ注射用1000	持続静注	4.5-5.1	瓶	2436.00
	ペルサンチン注射液[10mg]	1-3A(V)	2.5-3.0	A	62.00
	ミリスロール注5mg	(D)	3.5-6.0	A	527.00
外	アンタップR 40mg	1枚/24-48時間		枚	88.80
	ニトロダームTTS 25mg	1-2枚		枚	97.00
	ミオコールスプレー	1回1-2噴霧		缶	2021.90
	ミリステープ	1枚/12時間		枚	55.20

薬効別一覧

21血管収縮剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ジヒデルゴット[1mg]	3T分3	粉△変色	T	17.00
	ゾーミッグRM錠2.5mg	添付文書参照		T	934.10
	マクサルトRPD錠10mg	外 1T/回		T	921.90
	メトリジン錠2mg	2T分2 4T迄	粉×湿	T	48.60
注	イミグラン注3	1日1A(C)	4.2-5.3	本	3293.00

21高脂血症用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	EPLカプセル[250mg]	6C分3	粉×	C	8.90
	クレストール錠2.5mg	1日1回1T 最大2	粉×	T	76.40
	クレストール錠5mg	2.5mgより開始 最	粉×	T	148.10
	シンレスタール錠	2T分2	粉△変色	T	23.80
	ゼチーア錠10mg	1日1回1T		T	223.90
	ベザトールSR錠[200mg]	2T分2	粉×徐放	T	42.00
	メバロチン錠5	2T分1-2 4T迄	粉○	T	59.30
	メバロチン錠10	1T分1-2 2T迄	粉○	T	112.20

薬効別一覧

21不整脈用剤	用法用量	備考	単	薬価
内 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	4T→2T 分1-2		T	206.90
サンリズムカプセル25mg	6C分3	粉×舌マヒ	C	54.50
サンリズムカプセル50mg	3C分3	粉×舌マヒ	C	92.10
シベノール錠50mg	6T分3	粉×		
ピメノールカプセル50mg	4C分2	粉○苦み	C	89.80
プロノン錠150mg	3T分3	粉△苦み	T	85.80
メキシチールカプセル50mg	6C分3 9C迄	粉△舌マヒ	C	34.00
リスモダン50	6C分3	粉△舌マヒ	C	35.30
リスモダンR錠[150mg]	2T分2	粉×	T	89.60
硫酸キニジン錠100mg		粉△苦み		
注 アスペノン注 100mg 10mL	1.5-2mg/kg(V)	5.3-6.7	A	925.00
アミサリン注[100mg]	(M, V)	4.0-6.0	A	95.00
アンカロン注150	添付文書参照	3.5-4.5	A	3066.00
キシロカイン2%静注用5mL	(V)	5.0-7.0	本	94.00
サンリズム注射液50	(V)	4.8-6.5	本	768.00
シベノール注射液70mg	(V)	5.0-6.0	A	964.00
シンビット静注用50mg	添付文書参照	4.0-5.5	瓶	5374.00
メキシチール注射液[125mg]	(V, D)	5.0-6.5	A	736.00
リスモダンP注[50mg]	1回1-2A(V)	4.0-5.0	A	421.00

薬効別一覧

21その他の血圧降下剤		用法用量	備考	単	薬価
内	セララ錠50mg	1日1回1T 最大2		T	89.50

21利尿剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アルダクトンA錠25mg	2-4T	粉△光	T	23.40
	イソバイド	70-140mL分2-3		mL	5.90
	サムスカ錠15mg	1日1回1錠		T	2525.70
	ダイアート錠[30mg]	2T分1	粉△2W内	T	24.90
	ダイアモックス錠[250mg]	添付文書参照	粉○	T	28.70
	ナトリックス錠[1mg]	2T分1	粉△1W内	T	12.70
	フルイトラン錠2mg	1-4T分1-2	粉○	T	9.60
	ラシックス錠20mg	2-4T分1	粉△光	T	9.60
	ラシックス錠40mg	1-2T分1	粉△光	T	16.10
	ルプラック錠8mg	0.5-1T分1	粉○	T	43.70
注	ソルダクトン100mg	1-4A(V)	9.0-10.0	A	507.00
	ソルダクトン200mg	1/2-2A(V)	9.0-10.0	A	867.00
	ダイアモックス注射用[500mg]	(V, M)	9.0-10.0	瓶	690.00
	ラシックス注20mg	1A(M, V)	8.6-9.6	本	61.00
	ラシックス100mg注	(V)	8.6-9.6	本	168.00

221呼吸促進剤		用法用量	備考	単	薬価
注	アネキセート注射液0.5mg	(V)	3.0-5.0	本	3289.00
	塩酸エフェドリン 40mg 注【1mL】			本	92.00
	塩酸ナロキソン注射液[0.2mg]	(V)	3.0-4.5	A	963.00
	テラプチク筋注[2mL]	1回1-2A(C, M)	3.0-5.0	A	95.00
	ドプラム注射液400mg(20mL)	(V, D)	3.5-5.0	mL	72.00
外	サーファクテン	120mg/kg 分4-5		瓶	99433.00

222鎮咳剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アストフィリン	2-6T分2-3	粉△苦み	T	6.10
	アストミンシロップ(2.5mg/mL)	12-24mL分3		mL	3.80
	メジコン錠15mg	1-8T分1-4	粉○	T	5.80
	メジコン散(100mg/g)	有外 0.15-1.2g		g	25.80
注	エフェドリン注射液「ナガイ」[40mg]	5/8-1A(C)	4.5-6.5	本	92.00

薬効別一覧

223去たん剤		用法用量	備考	単	薬価
内	クリアナール錠200mg	6T分3		T	12.10
	セネガシロップ	10-35mL分3		mL	1.34
	ビソルボンシロップ(0.8mg/mL)	15mL分3		mL	4.20
	ムコソルバン錠[15mg]	3T分3	粉O	T	21.80
	ムコダイン DS 50%	10mg/kg分3		g	37.70
注	ビソルボン注射液[4mg]	1-4A(M, V)	2.2-3.2	A	59.00
外	ビソルボン吸入液(2mg/mL)45mL	2mL 1日3回		mL	18.30
	ムコフィリン液(2mL)	1回0.5-2A	pH2.2	包	66.40

224鎮咳去たん剤		用法用量	備考	単	薬価
内	キョウニン水	3mL分3-4		mL	1.63
	メジコンシロップ	18-24mL分3-4		mL	2.41
	リン酸コデイン100倍散	6g分3		g	7.90

225気管支拡張剤		用法用量	備考	単	薬価
外	メプチンエアー 5mL	1回2吸入		K	993.80
	メプチンエアー 5mL	1回2吸入			

薬効別一覧

225気管支拡張剤		用法用量	備考	単	薬価
内	スピロペント錠[10 μ g]	4T(朝、眠前)	粉○	T	17.30
	テオドール錠50mg	小児:4-8T分2	粉×	T	8.20
	テオドール錠100mg	大人:4T分2	粉×	T	12.40
	テオドール錠200mg	大人:2T分2	粉×	T	19.40
	テオロング顆粒50%(500mg/g)	0.8g分2		g	42.10
	メプチンシロップ(5 μ g/mL)	10-20mL分1-2		mL	8.80
	ユニフィルLA錠200	2T分1(夕)	粉×徐放	T	24.50
	ユニフィルLA錠400	1T分1(夕)	粉×徐放	T	39.30
注	ブリカニール注射液[0.2mg]	1回1A(C)	3.2-4.2	A	62.00
外	アトロベントエロゾル20 μ g	1-2吸入 3-4/日		瓶	948.80
	インタールエアロゾルA	1日4回→2-3回		瓶	3052.10
	サルタノールインヘラー(13.5mL)	1回2吸入 4回迄		瓶	1004.60
	スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入	1回2吸入 1日1回		K	6767.70
	セレベント50ディスクス(60 μ リスター/個)	1日2回		K	3951.70
	ベネトリン吸入液(30mL)	1回0.3-0.5mL		mL	25.90
	ホクナリンテープ0.5mg	有 添付文書参照		枚	49.80
	ホクナリンテープ2mg	添付文書参照		枚	93.10

226含嗽剤		用法用量	備考	単	薬価
外	イソジンガーグル(30mL)	1日数回		mL	3.40
	ハチアズレ含嗽用(2g/包)	1包 1日数回		g	6.00

229その他の呼吸器官用薬		用法用量	備考	単	薬価
外	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	100~400分1 Ma		K	2265.60
	シムビコートタービューヘイラー60吸入	1日2回 Max最高		K	6036.60
	パルミコート200タービューヘイラー	1-2吸入1日2回		瓶	2095.90
	フルタイド200ディスクス	2puff分2		個	2977.70

薬効別一覧

231止しゃ剤, 整腸剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ガスコン錠40mg	3-6T分3	粉×	T	5.90
	ガスコンドロップ(20mg/mL)	2-4mL		mL	3.90
	バロス消泡液	2-4mL		mL	3.90
	フェロベリンA	6T分3	粉△苦み	T	8.00
	ミヤBM錠	3-6T分3		T	5.70
	ミヤBM細粒	1.5-3g分3		g	6.30
	薬用炭	2-20g		g	8.10
	ロペミンカプセル[1mg]	1-2C分1-2	粉○	C	58.10

232消化性潰瘍用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アルサルミン細粒	3-3.6g分3		g	6.80
	アルサルミン内用液10%	3包分3		mL	4.10
	アルサルミン内用液10%	外 3包分3		mL	4.10
	ガスターD錠20mg	0.5-2T分1-2	粉○	T	53.90
	ガスロンN・OD錠2mg	2T分1-2		T	71.00
	サイトテック錠200	4T分4	粉×	T	38.60
	タケプロンOD錠15	1-2T分1	口腔内崩壊	T	104.00
	タケプロンOD錠30	1-2T分1	口腔内崩壊	T	181.50
	ドグマチール錠[50mg]	3T分3	粉△4W内	T	17.00
	ドグマチール細粒10%	3-6g		g	27.00
	プロテカジン錠10	1-2T分1-2		T	45.20
	プロマックD錠75	2T(朝、眠前)		T	40.70
	ムコスタ錠100	3T(朝夕眠前)	粉△苦み	T	19.30
	ムコスタ顆粒20%	3P(朝夕眠前)		g	36.30
注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	2V分2(D、V)	9.5-11.0		
	タガメット注射液200mg	(M、V、D)	4.5-6.0	本	147.00
	ファモチジン注射用20mg「サワイ」	2A分2(M、V、D)	4.7-5.7	A	170.00

薬効別一覧

233健胃消化剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ゲンチアナ末	0.3-0.5g		g	3.11
	ジアスターゼ	0.9-1.5g分3		g	2.39
	タフマックE顆粒	1.5-3g分2-3	粉×	g	12.40
	ポリトローゼカプセル	3C分3	開封マ可	C	8.60

234制酸剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アドソルビン	3-10g分3-4		g	1.15
	酸化マグネシウム	0.5-2g		g	0.69
	炭カル錠(旭化成)500mg	2-6T分3-4	粉△吸湿	T	5.70
	炭酸水素ナトリウム	3-5g		g	0.72
	沈降炭酸カルシウム	1-3g分3-4		g	0.72
	マグミット錠250mg	1日1-8T		T	5.70
	マグミット錠330mg	1日1-6T		T	5.70

235下剤 浣腸剤		用法用量	備考	単	薬価
内	プルゼニド錠	1-2T眠前4T迄	粉△湿	T	5.60
	ラキソベロン液[10mL]	10-15滴分1		mL	28.80
	ラキソベロン錠 2.5mg	2-3T分1	粉×湿	T	10.10
外	グリセリン			mL	0.93
	グリセリン浣腸「オヲタ」30mL			個	75.50
	グリセリン浣腸「オヲタ」60mL			個	121.20
	グリセリン浣腸「オヲタ」120mL			個	153.20
	新レシカルボン坐剤	1回1-2個		個	53.30

薬効別一覧

236利胆剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ウルサミック錠50	3-12T分3	粉△苦み	T	6.00
	ウルソ100	1.5-6T分3	粉△苦み	T	13.00
	スパカール錠[40mg]	3T分3	粉○	T	19.90

239その他の消化器官用薬		用法用量	備考	単	薬価
内	アサコール錠400mg	6Tor9T分3		T	86.50
	イメドカプセル80mg	125-80-80 3日間		C	3263.80
	イメドカプセル125mg	125-80-80 3日間		C	4774.70
	カイトリル錠2mg	2T分1		T	1343.90
	ガスモチン錠5mg	3T分3	粉○	T	20.60
	ガナトン錠50mg		粉△苦み	T	20.30
	コロネル細粒(0.6g/包)	1.8-3.6g分3		g	30.30
	セレキノン錠[100mg]	3-6T分3	粉△刺激	T	18.50
	ナウゼリン錠10	3T分3	粉○	T	18.00
	プリンペランシロップ(1mg/mL)	10-30mL分2-3		mL	3.47
	ペンタサ錠 500	添付文書参照		T	55.40
注	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」	40 μg/kg(D)	5.0-7.0	袋	4406.00
	テルペラン注射液 0.5% 2mL	1-2A(M, V)	2.0-4.0	A	56.00
外	アズノールST錠口腔用5mg	1T 1日4回	粉×	T	19.10
	アフタッチ[25 μg]	1T 1日1-2回		T	44.50
	SPTローチ明治	6T分6		T	5.80
	サリベート 50g	1日4-5回		個	689.10
	デキサルチン軟膏(口腔用)(2g)	1日1-数回		g	66.30
	ナウゼリン坐剤10	添付文書参照		個	67.50
	ナウゼリン坐剤60	2個 分2		個	149.20
	複方ヨードグリセリン	適量		mL	1.31

薬効別一覧

241脳下垂体ホルモン剤		用法用量	備考	単	薬価
注	アトニン-O 5単位	(M、V、D)	2.5-4.5	A	160.00
	HMG注テイゾー 75単位			A	1729.00
	HMG注テイゾー 150単位			A	2574.00
	ゴナトロピン3000単位	(M)		A	346.00
	ゴナピュール注用75	(C、M)	6.5-7.0	A	1539.00
	ピトレシン注射液[20単位]	(C、M、V、D)	3.0-4.0	A	806.00
	ヒュメゴン75単位	1-2A(M)	6.5-7.0		
	ヒュメゴン150単位	0.5-1A(M)	6.5-7.0		
	プロファシー注5000	(M)	6.0-7.0		
外	デスマプレシン点鼻液協和250 μ g	1日1-2回		瓶	7999.00
	デスマプレシン・スプレー2.5協和	1日1-2回		瓶	5417.90

243甲状腺 副甲状腺ホルモン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	チラーヂンS錠[50 μ g]	0.5-8T分1	粉○変色	T	9.60
	チラーヂン末	維持0.04-0.2g		g	82.70
	プロパジール錠[50mg]	維持1-2T分1-2	粉△苦み	T	9.60
	メルカゾール錠[5mg]	維持:1-2T	粉○苦み	T	9.60

244たん白同化ステロイド剤		用法用量	備考	単	薬価
内	プリモボラン錠	2-4T分2-3	粉○	T	12.80
注	デカ・デュラボリン25	25-50mg/3W(M)			

薬効別一覧

245副腎ホルモン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	コートリル錠[10mg]	1-12T分1-4	粉○	T	7.80
	コートン錠25mg	0.5-6T分1-4	粉○	T	25.50
	セlestamin錠	1-8T分1-4	粉×	T	11.20
	デカドロン錠	1-16T分1-4	粉○	T	5.90
	プレドニン錠5mg	1-12T分1-4	粉○	T	9.60
	プレドニゾン錠1mg(旭化成)			T	8.10
	メドロール錠[4mg]	1-12T分1-4	粉△苦み	T	20.30
	リンデロン錠[0.5mg]	1-16T分1-4	粉○	T	16.70
	リンデロン散(1mg/g)	0.5-8g分1-4		g	33.90
	リンデロンシロップ(0.1mg/mL)	5-80mL		mL	7.50
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	添付文書参照		筒	174.00
	エピネフリン注0.1%シリンジ「テルモ」	(C, M)		筒	174.00
	エピペン注射液0.3mg(要時購入)	0.01mg/kg			薬価未収載
	オルガドロン注射液1.9mg	(M, V, D, etc)	7.0-8.5	A	102.00
	オルガドロン注射液3.8mg	(M, V, D, etc)	7.0-8.5	A	161.00
	水溶性プレドニン10mg	(M, V, D)	6.5-7.2	本	119.00
	水溶性プレドニン20mg	(M, V, D)	6.5-7.2	本	219.00
	水溶性プレドニン50mg	(M, V, D)	6.5-7.2	本	510.00
	ソルコーテフ100	(M, V, D)	7.0-8.0	瓶	349.00
	ソルコーテフ500	(V, D)	7.0-8.0	瓶	1376.00
	ソルメドロール40	(V, D)	7.0-8.0	瓶	465.00
	ソルメドロール125	(V, D)	7.0-8.0	瓶	1170.00
	ソルメドロール500	(V, D)	7.0-8.0	瓶	3743.00
	ソルメドロール1000	(V, D)	7.0-8.0	瓶	6620.00
	ノルアドリナリン[1mg]	(C, D)	2.3-5.0	A	92.00
	ボスミン注[1mg]	(C, M, V)	2.3-5.0	A	94.00
	リメタゾン静注2.5mg	1回1A/2W(V)	6.5-8.5	A	2151.00
	リンデロン注2mg	(M, V, D)	7.0-8.0	A	194.00
	リンデロン注4mg	(M, V, D)	7.0-8.0	A	325.00
	リンデロン注20mg	(M, V, D)	7.3-8.3	A	1415.00
	リンデロン懸濁注[2.5mg]	(C, M)		本	216.00
外	プレドネマ注腸20mg			個	813.40
	ボスミン液0.1%	5-10倍希釈		mL	7.90
	マイリス膺坐剤[600mg]	1日1回1個			

薬効別一覧

外 リンデロン坐剤0.5mg	添付文書参照		個	83.60
リンデロン坐剤1mg	添付文書参照		個	117.10

薬効別一覧

247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	デュファストン[5mg]	1-4T分1-3	粉○	T	39.50
	パーセリン錠25	2T分2	粉○	T	120.60
	プレマリン錠0.625mg	1-6T	粉△光湿	T	12.60
	プロスタール錠25	2-4T分2	粉○	T	113.40
	プロベラ[2.5mg]	1-6T分1-3	粉△湿	T	29.10
	ホーリン錠1mg	添付文書参照	粉○	T	16.60
	ルトラール錠[2mg]	1-6T分1-3	粉○	T	28.20
注	オバホルモンドポー5mg	1-10mg(C)		A	185.00
	プロゲデポー125mg	1W1回0.5-1A(M)		A	183.00
	プロゲホルモン25mg	0.4-2A(M)		A	153.00
外	エストラーナテープ0.72mg	1枚/2日		枚	118.60

248混合ホルモン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ノアルテンD錠	1T(7-10日)	粉○		
	プラノバル	1T(7-10日)		T	14.00
	ルテジオン配合錠	添付文書参照		T	28.80
	ルナベル配合錠	有 1日1回1錠21日間		T	328.80
注	プリモジアンデポー	1回1A/2-4W(M)		A	525.00

薬効別一覧

249その他ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		用法用量	備考	単	薬価
内	アボルブカプセル0.5mg	有 1日1回1T	CYP3A4	C	206.50
	セキノビット[100mg]	— 4-6T分2-3	粉○	T	34.90
	セロフェン錠[50mg]	— 1クール:1T5日		T	113.10
	ディナゲスト錠1mg	有 2T分2 月経周期		T	462.30
	フロスタグランゾンE2錠0.5mg「科研」	— 6T分6			
	ボンゾール錠100mg	— 2-4C分2	粉△光	T	228.00
	ボンゾール錠200mg	— 1-2C分2	粉△光	T	426.00
	ローザグッド錠50	— 3T分3	粉×腸溶	T	14.40
注	イノレットR注300(3mL)	— 維持:4~100E(C)	6.8-7.8	K	2056.00
	イノレットN注 300(3mL)	— 維持:4~80E(C)	6.9-7.5	K	2083.00
	イノレット30R注300(3mL)	— 維持:4~80E(C)	6.9-7.5	K	2076.00
	サンドスタチン注射液 50 μg	—	3.7-4.7	A	1821.00
	ゾラデックス1. 8mgデポ	— 前腹部(皮下)		筒	33411.00
	ゾラデックス3. 6mgデポ	— 前腹部(皮下)		筒	43856.00
	ゾラデックスLA10. 8mgデポ	— 前腹部(皮下)		筒	76883.00
	ノボラピッド注 イノレット	— 添付文書参照		K	2150.00
	バイエッタ皮下注5 μgペン300	— 1日2回朝夕食前		K	9661.00
	バイエッタ皮下注10 μgペン300	— 1日2回朝夕食前		K	9661.00
	ヒューマカート3/7注キット(3mL)	— 維持1日4-80E(C)	7.0-7.8	K	1945.00
	ヒューマリン3/7注U-100(10mL)	— 維持1日4-80E(C)	7.0-7.8	mL	368.00
	ヒューマリンN注U-100(10mL)	— 維持4-80E(C)	7.0-7.8	mL	368.00
	ヒューマリンR注U-100(10mL)	— 維持1日4-100E(C)	7.0-7.8	mL	356.00
	ヒューマログ注ミリオペン	— 1回2-20E(C)	7.0-7.8	K	11,900.00
	ヒューマログミックス25注ミリオペン	— 維持4-80E(C)	7.0-7.8	K	11,900.00
	ヒューマログミックス50注ミリオペン	— 維持4-80E(C)	7.0-7.8	K	11,900.00
	ヒューマログN注ミリオペン	— 維持4-80E(C)	7.0-7.5	K	11,925.00
	プロスタルモン・F注射液1000	— (D)	7.0-9.0	本	979.00
	ランタス注オプチック	— 維持4-80E(C)	3.5-4.5	筒	1773.00
	ランタス注ソロスター	— 維持4-80E(C)	7.0-7.8	K	2453.00
	リュープリン注射用キット1. 88	— (C)	6.0-7.5	筒	33524.00
	リュープリン注射用キット3. 75	— 1回1瓶/4W(C)	6.0-7.5	筒	45746.00
	リュープリンSR注射用キット11.25	— (C)	6.0-7.1	筒	81743.00
	レベミル注 イノレット	— 添付文書参照		K	2334.00
外	ナサニール点鼻液	— 1日2回		瓶	10712.40

薬効別一覧

外 プレグランدين腔坐剂[1mg]	有	1個/3H 5個迄		個	4075.70
--------------------	---	-----------	--	---	---------

251 泌尿器官用剂		用法用量	備考	単	薬価
外 ウロマチックS 3%3L		1-15L		袋	1169.30

薬効別一覧

252生殖器官用剤		用法用量	備考	単	薬価
外	オキコナール錠600mg	有 1週1回1錠		T	261.20
	クロマイ錠[100mg]	1日1回1T		T	76.90
	フラジール錠[250mg]	1T/日 10-14日		T	38.60
	ホーリンV錠[1mg]	1日1回0.5-1T		T	31.30

253子宮収縮剤		用法用量	備考	単	薬価
内	メテルギン錠[0.125mg]	1-8T分2-4	粉△光	T	10.10
注	メテナリン[0. 2mg]	0.5-1A(C、M、V)	2.7-3.7	A	62.00

255痔疾用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ヘモクロン[200mg]	3C分3	粉×	C	25.60
注	ジオン注 生食液付			瓶	4520.00
外	強力ポステリザン軟膏(2g)	1日1-3回		g	27.20
	ボラザG坐剤	1個 1日2回		個	38.80
	ボラザG軟膏(2. 4g)	1個 1日2回		g	36.60

259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		用法用量	備考	単	薬価
内	ウリトス錠0.1mg			T	96.50
	エビプロスタット配合錠DB	3T分3		T	51.00
	セルニルトン錠	4-6T分2-3		T	17.60
	バップフォー錠10	2T分1 4T迄	粉△苦み	T	84.30
	ハルナールDO. 2mg	1C分1	開封/可	T	155.20
	ブラダロン錠	3T分3	粉×	T	51.10
	フリバスOD錠25mg	1T→2-3T分1		T	55.70
	ベシケア錠5mg	1回1T最大2T	粉×	T	189.80

725切迫流・早産治療剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ウテメリン[5mg]	3T分3	粉×	T	127.00
注	リトドリン点滴静注50mg「PP」	(D)	4.7-5.5	A	247.00

薬効別一覧

261 外皮用殺菌消毒剤		用法用量	備考	単	薬価
外	イソジンクリーム産婦人科用(250g)			g	6.41
	イソジンゲル(4g)			g	6.11
	イソジンゲル(90g)			g	6.11
	消毒用エタノール			mL	1.34
	ステリクロンW液0.05(500mL)			mL	0.57
	ネオヨジン液 10% 250mL			mL	1.40
	ネオヨジンスクラブ7.5%(500mL)			mL	2.47
	ハイポエタノール			mL	0.75
	ピオクタニン液0.2%				院内製剤
	ホルマリン			mL	0.88
	マスクンWエタノール液			mL	0.63
	無水エタノール			mL	0.95
	ヨウ素			g	7.90

263 化膿性疾患用剤		用法用量	備考	単	薬価
外	アクアチムクリーム(10g)	1日2回		g	46.10
	ゲーベンクリーム	1日1-数回		g	13.90
	ゲンタシン軟膏(10g)	1日1-数回		g	14.60
	ソフラチュール	1-数枚		枚	60.30
	フランセチンTパウダー(10g)			g	23.90

薬効別一覧

264鎮痛鎮痒収斂消炎剤(ステロイド)		用法用量	備考	単	薬価
外	アルメタ軟膏(5g)	1日1-数回		g	43.40
	アンテベート軟膏(5g)	1日1-数回		g	36.80
	アンテベートローション0.05%	1日1-数回		g	36.80
	キンダベート軟膏(5g)	1日1-数回		g	38.10
	デルモベートスカルプ(10g)	1日1-数回		g	39.40
	デルモベートクリーム(5g)	1日1-数回		g	34.30
	デルモベート軟膏(5g)	1日1-数回		g	34.20
	ドレニゾンテープ 7.5×10cm	12又は24時間毎			88.70
	フルメタクリーム(5g)	1日1-数回		g	43.80
	フルメタ軟膏(5g)	1日1-数回		g	43.80
	フルメタローション(10g)	1日1-数回		g	43.80
	ボアラクリーム(5g)	1日1-数回			
	ボアラ軟膏(5g)	1日1-数回			
	リンデロンV軟膏0.12%(5g)	1日1-数回		g	31.10
	リンデロン-Vクリーム0.12%	1日1-数回		g	31.10
	ロコイドクリーム(5g)	1日1-数回		g	18.50
	ロコイド軟膏(5g)	1日1-数回		g	18.50

264鎮痛鎮痒収斂消炎剤(ステロイド+抗菌薬)		用法用量	備考	単	薬価
外	テラコートリル軟膏(5g)	1日1-数回		g	34.30
	テラコートリル軟膏(25g)	1日1-数回		g	34.30
	リンデロンVG軟膏0.12%(5、30g)	1日1-数回		g	31.90
	リンデロンVGローション(10mL)	1日1-数回		mL	31.90

薬効別一覧

264鎮痛鎮痒収斂消炎剤(その他)		用法用量	備考	単	薬価
外	亜鉛華デンプン	1-数回		g	2.65
	亜鉛華軟膏	1日～数回		g	1.96
	アズノール軟膏0.033% 20g/本	1日数回		g	3.13
	インテバンクリーム(50g)	1日数回		g	8.30
	エアーサロンパス(100mL)	1日1-数回		mL	2.62
	エキザルベ(5g)	1日1-数回		g	24.80
	エキザルベ(25g)	1日1-数回		g	24.80
	オイラックスクリーム(10g)	1日数回		g	3.67
	ザーネ軟膏	1日2-3回		g	3.70
	スタデルム軟膏5%	1日数回		g	20.90
	スタデルムクリーム5%	1日数回		g	20.90
	スチックゼノールA(40g)	1日1-数回		g	5.40
	セクターローション(50mL)	1日数回		mL	7.60
	フェノール亜鉛華リニメント	1日1-数回		g	0.90
	レスタミンコーワクリーム1%	1日数回			

264鎮痛鎮痒収斂消炎剤(ハップ)		用法用量	備考	単	薬価
外	MS温シップ「タカミツ」(100g)	1日1-2回		g	1.00
	MS冷シップ「タカミツ」(100g)	1日1-2回		g	0.95
	セルタッチ(7枚入り)	1日2回		枚	25.20
	ミルタックス(7枚入り)	1日2回		枚	22.50

薬効別一覧

265寄生性皮膚疾患用剤		用法用量	備考	単	薬価
外	アスタット軟膏(10g)	1日1回		g	49.20
	イオウ			g	1.17
	サリチル酸	1日1-2回		g	2.49
	ニゾラルクリーム(10g)	1日1-2回		g	46.50
	ラミシールクリーム(10g)	1日1回		g	44.50
	ラミシール外用液1%(10g)	1日1回		g	44.50
	ルリコンクリーム1%	1日1回		g	53.40
	ルリコン液1%	1日1回		mL	53.40

266皮膚軟化剤		用法用量	備考	単	薬価
外	ウレパールクリーム10%	1日2-3回		g	7.80
	ウレパールL(20g)	1日2-3回		g	7.80
	ケラチナミンコーワ軟膏(25g)	1日1-数回		g	8.10
	硝酸銀			g	199.20
	スピール膏M	1回/2-5日		枚	90.60

267毛髪用剤		用法用量	備考	単	薬価
外	フロジン液(30mL)	1日2-4回		mL	34.90

薬効別一覧

269その他の外皮用薬		用法用量	備考	単	薬価
外	アクトシン軟膏(30g)	1日1-2回		g	53.40
	オキサロール軟膏(10g) 25 μ g/g	1日2回適量	1日10gまで	g	138.00
	カデックス(50g)	1日1-2回		g	79.40
	カデックス軟膏0.9%	1日1-2回		g	79.40
	ディフェリンゲル0.1%15g	顔面のみ		g	117.70
	ドボネックス軟膏(10g)	1日2回適量		g	134.80
	フィブラストスプレー500	添付文書参照	冷暗2W内	瓶	10799.40
	プロスタンディン軟膏(30g)	1日2回 8W迄		g	58.70
	プロトピック軟膏0.1%(5g)	1日1-2回 5g迄		g	141.30
	ユーパスタコーワ(チューブ100g)	1日1-2回		g	43.50

290その他の個々の器官系医薬品		用法用量	備考	単	薬価
内	セファランチン末(10mg/g)	0.3-0.6g		g	69.50
注	セファランチン注射液10.0mg	(C、V)	2.5-3.5	本	169.00

薬効別一覧

31 ビタミン剤	用法用量	備考	単	薬価
内 グラケーカプセル15mg	3C分3	粉×	C	39.10
ケイツーシロップ(2mg/mL)	1mL分1		mL	27.80
ケーワン錠[5mg]	1-3T分服	粉△光	T	16.70
チガソソカプセル10	有 添付文書参照	粉×	C	261.90
パントシン錠100	添付文書参照	粉△光湿	T	10.40
パントシン5倍散	添付文書参照		g	18.20
フォリアミン錠[5mg]	1-4T分2-3	粉△光	T	9.60
メチコバル錠500 μ g	3T分3	粉×	T	21.10
メチコバル細粒(500 μ g/包)	3包 分3		包	28.00
ロカルトロールカプセル0.25 μ g	2-8C分1	粉×	C	37.50
ロカルトロールカプセル0.5 μ g	1-4C分1	粉×	C	67.70
ワンアルファ錠0.25	2-16T分1	粉○	T	25.30
ワンアルファ錠0.5	1-8T分1	粉○	T	47.00
ワンアルファ錠1.0	1-4T分1	粉○	T	85.50
注 アリナミンF50注射液(VB1)	0.1-2A(C, M, V)	3.3-4.3	本	78.00
オキサロール注2.5 μ g	1回2.5-10 μ g	7.8-8.2	本	1273.00
オキサロール注5 μ g	1回2.5-10 μ g	7.8-8.2	本	1645.00
オキサロール注10 μ g	1回2.5-10 μ g	7.8-8.2	本	2424.00
ケイツーN注静注用10mg	1-2A(V, D)	6.0-8.0	A	88.00
パントシン注10%[200mg]	(C, M, V)	4.2-5.2	本	61.00
メチコバル注射液500 μ g	1A(C, M, V)	6.0-8.0	本	122.00
ロカルトロール注0.5 1mL	1回0.5-1.5 μ g	7.1-7.6	本	1147.00
ロカルトロール注1 1mL	1回0.5-1.5 μ g	7.1-7.6	本	1687.00

薬効別一覧

31 ビタミン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	エディロールカプセル0.5 μ g	1日1回1C		C	68.50
	エディロールカプセル0.75 μ g	1日1回1C		C	98.80

31 混合ビタミン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ビタノイリン25(VB1・2・6・12)	1-4C	開封マ可	C	7.60
注	シーパラ注(VB1.2.6.パントシnC)	(C、M、V)	4.5-5.5	A	57.00

321カルシウム剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アスパラCA錠200	6T分2-3	粉△吸湿	T	6.00
	乳酸カルシウム	2-5g分2-5		g	2.69
注	塩カル注「オーツカ」20mL	20-50mL(V)	5.6-7.6	A	92.00
	カルチコール注射液8.5%[5mL]	4.7-23.5mL(V)	6.0-8.2	本	68.00

322無機質製剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アスパラK錠[300mg]	3-9T分3	粉×吸湿	T	6.00
	アスパラK散(500mg/g)	1.8-5.4g分3		g	7.00
	インクレミンシロップ	添付文書参照		mL	6.10
	スローケー[600mg]	4T分2	粉×	T	8.20
	フェルムカプセル	1C分1	開封マ可	C	10.30
	フェロミア錠50mg	2-4T分1-2	粉△光湿	T	10.80
	ヨウ化カリウム	添付文書参照		g	7.20
注	アスパラカリウム注10mEq	(D)	6.5-7.5	A	68.00
	エレジェクト2mL	(D)	4.5-6.0	筒	218.00
	フェジン注40mg	(D)	9.0-10.0	A	63.00
	リン酸2カリウム20mEqシリンジ「テルモ」20mL		8.6~9.3	K	199.00

薬効別一覧

323糖類剤	用法用量	備考	単	薬価
注 ブドウ糖注射液5%20mL	(V)	3.5-6.5	本	64.00
ブドウ糖注50%PL「フソー」	(V,D)	3.5-6.5	A	61.00
ブドウ糖注射液5%100mL	1回0.5-1L(D)	3.5-6.5	袋	108.00
ブドウ糖注射液5%250mL	1回0.5-1L(D)	3.5-6.5	袋	120.00
ブドウ糖注射液5%500mL	1回0.5-1L(D)	3.5-6.5	瓶	134.00
ブドウ糖注射液10%500mL	1回0.5-1L(D)	3.5-6.5	袋	125.00
ブドウ糖注射液50%200mL	(IVH)	3.5-6.5	袋	224.00
ブドウ糖注射液50%500mL	(IVH)	3.5-6.5	袋	253.00
マルトース注ML10%250mL	1回2-4袋(D)	4.0-6.0	袋	188.00

薬効別一覧

325たん白アミノ酸製剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アミノレバンEN(1袋50g)	3袋分3		g	10.78
	アミュー顆粒	3包分3		包	52.60
	エレンタール			g	5.92
	エンシュア・リキット(ストロベリー)(250mL)	6-9缶		ML	0.77
	エンシュア・リキット(コーヒー)(250mL)	6-9缶		ML	0.77
	エンシュア・リキット(バニラ)(250mL)	6-9缶		ML	0.77
	リーバクト顆粒 4.74g/包	3包分3		包	252.60
注	アミノレバン200mL	1回2.5-5袋(D)	5.5-6.5	袋	428.00
	アミノレバン500mL	1回1-2袋(D)	5.5-6.5	袋	867.00
	アミパレン200mL	1日2-4袋(H)	6.5-7.5	袋	278.00
	ネオアミュー200mL	1日1-2袋(V、D、H)	6.6-7.6	袋	537.00
	ネオパレン1号 1000mL	1日2袋	6.8	K	1292.00
	ネオパレン2号 1000mL	1日2袋	6.8	K	1414.00
	ビーフリード輸液(500mL袋)	2h/本 Max5本		K	529.00

326臓器製剤		用法用量	備考	単	薬価
注	アデラビン9号1mL	1-2A(C、M、V)	5.5-6.5	A	164.00

329その他の滋養強壮薬		用法用量	備考	単	薬価
注	イントラリポス注20%100mL	250mL(D)	6.5-8.5	袋	565.00

薬効別一覧

331血液代用剤		用法用量	備考	単	薬価
注	大塚食塩注10% 20mL		5.3-7.3	A	64.00
	サリンヘス輸液(OP専用)	100-1,000mL	5.0-7.0	袋	880.00
	生理食塩液50mL	(C、V、D)	4.5-8.0	瓶	92.00
	生理食塩液100mL	(C、V、D)	4.5-8.0	瓶	92.00
	生食溶解液キットH 100mL		4.5-8.0	K	190.00
	生食液NS(ルアーフィットポリエチレン容器)	(C、V、D)	4.5-8.0	A	61.00
	生理食塩液500mL	(C、V、D)	4.5-8.0	袋	121.00
	生理食塩液1L	(C、V、D)	4.5-8.0	袋	234.00
	ソリタックスH500mL	1回1-2瓶(D)	5.7-6.5	瓶	237.00
	ソルデム1 200mL	1回2.5-5袋(D)	4.5-7.0	袋	99.00
	ソルデム1 500mL	1回1-2袋(D)	4.5-7.0	袋	104.00
	ソルデム3A 200mL	1回2.5-5袋(D)	5.0-6.5	袋	102.00
	ソルデム3A 500mL	1回1-2袋(D)	5.0-6.5	袋	105.00
	ソルラクト500mL	1回1-2袋(D)	6.0-7.5	袋	121.00
	低分子デキストランL注250mL	(D)	5.0-7.5	袋	504.00
	フィシザルツ-PL 500mL		4.5-8.0		
	フィシザルツ-PL 500mL		4.5-8.0	袋	121.00
	フィシザルツ-PL 1000mL		4.5-8.0	袋	234.00
	フィシザルツ-FC1.5L(HD専用)		4.5-8.0		

333血液凝固阻止剤		用法用量	備考	単	薬価
注	アリクストラ皮下注1.5mg	(C)CLcr20~30m		筒	1545.00
	アリクストラ皮下注2.5mg	(C)CLcr30~50m		筒	2146.00
	クリバリン注1000		5.5-6.8	瓶	1,412.00
	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリ	(C)添付文書参照		筒	423.00
	リコモジュリン点滴静注用12800	1日1回380U/kg		瓶	38352.00

薬効別一覧

332止血剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アドナ錠30mg	1-3T分3	粉○	T	12.10
	トランサミン錠[250mg]	3-8T分3-4	粉△苦み	T	11.20
	トロンビン細粒[経口](5千u/包0.5g)	添付文書参照		包	1002.50
注	アドナ注(静脈用)50mg0.5%10ml	0.5-2A(V, D)	5.5-6.2	A	65.00
	アドナ注(静脈用)100mg0.5%20ml	0.25-1A(V, D)	5.5-6.2	A	112.00
	エトキシクレロール1%注射液[30mL]	添付文書参照		瓶	20413.00
	オルダミン注射用10%10g	添付文書参照		瓶	20457.00
	トランサミン注5%[250mg]	1-2A(M, V)	7.0-8.0	本	64.00
	トランサミン注10%[1000mg]	1/4-1/2A(M, V)	7.0-8.0	本	134.00
	ノボ硫酸プロタミン(10mg/mL)10mL	(V)	5.0-7.0	mL	68.20
	レプチラーゼS注[2mL]	1-2mL(M, V)		A	217.00
外	アビテン(1g)	添付文書参照		個	薬価未収載
	アビテン(シートタイプ)	添付文書参照		枚	薬価未収載
	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型Ⅱ			枚	1718.80
	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型Ⅱ				
	スポンゼル 5×2.5cm	添付文書参照		枚	242.30
	トロンビン液ソフトボトル5千単位	添付文書参照		K	1,205.90
	トロンビン液ソフトボトル1万単位	添付文書参照		K	1,743.50

333血液凝固阻止剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ワーファリン錠1mg	維持:1-5T分1	粉△光	T	9.60
注	オルガラン注 1250単位 1mL	(V)	6.0-7.5	A	1457.00
	透析用ヘパリンNa注250単位/mL5000単位			A	112.00
	ノボヘパリン注1000(5mL)	(C, M, V, D)	6.0-8.0	瓶	230.00
	ペミロック100シリンジ		6.0-7.5	筒	205.00
	ペミロック10シリンジ		6.0-7.5	筒	165.00
	ローヘパ注500(10mL)			瓶	1156.00
外	ヒルドイドソフト(25g)	1日1-数回		g	27.80

薬効別一覧

339その他の血液・体液用薬		用法用量	備考	単	薬価
内	アンブラーグ錠100mg	3T分3	粉△苦み	T	145.20
	エパデールS900	3包分3	粉×	包	138.90
	プロレナール錠5μg	3-6T分3	粉×	T	72.30
	ベルナール錠20μg	6T分3	粉×湿	T	29.90
注	グランシリンジ75	(C、D)	3.7-4.3	筒	10981.00
	グランシリンジ150	(C、D)	3.7-4.3	筒	21811.00
	グランシリンジM300	(C、D)	3.7-4.3	筒	27325.00
	ノイトロジン注50μg	(C、V、D)	6.0-7.5	瓶	6155.00
	ノイトロジン注100μg	(C、V、D)	6.0-7.5	瓶	11339.00
	ノイトロジン注250μg	(C、V、D)	6.0-7.5	瓶	28144.00
外	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	添付文書参照			2,197.00

339その他の血液・体液用薬(抗血小板剤)		用法用量	備考	単	薬価
内	バイアスピリン錠100mg	1T分1 最大3T	粉×	T	5.80
	パナルジン錠[100mg]	2-6T分2-3	粉△苦み	T	61.90
	パナルジン細粒 10%	2-6g分2-3		g	69.40
	プレタールOD錠50	4T分2	粉○	T	105.50
	プレタールOD錠100	2T分2	粉○	T	189.50

341人工腎臓透析用剤		用法用量	備考	単	薬価
注	キンダリー液AF2号 6L	添付文書参照		瓶	1847.00
	キンダリー液AF2号 9L	添付文書参照		瓶	2446.00
	キンダリー液AF2P号 10L	添付文書参照		瓶	1211.00
	キンダリー液AF3号 6L	添付文書参照		瓶	1871.00
	キンダリー液AF3号 9L	添付文書参照		瓶	2563.00
	キンダリー2E号	添付文書参照		組	1097.00
	サブラッド-BS	添付文書参照			

342腹膜透析用剤		用法用量	備考	単	薬価
注	ダイアニールPD-2 1.5	添付文書参照			
	ダイアニールPD-2 2.5	添付文書参照			
	ダイアニールPD-2 4.25	添付文書参照			

薬効別一覧

391 肝臓疾患用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ネオファーゲンC錠	6-9T分3	粉△湿	T	5.60
	プロヘパール錠	3-6T分3	粉×臭湿	T	7.40
	リバオール散	0.2-0.6g分2-3			
注	ネオファーゲン注 20mL	2-3A(V, D)	6.0-8.5	A	56.00

392 解毒剤		用法用量	備考	単	薬価
内	エクジェイド懸濁用錠125mg	20mg/kg/日 Max3		T	1161.60
	クレメジン細粒(2g)	3包分3		g	117.20
	ロイコボリン錠25mg(ユーゼル対応)	有 3T分3	粉×	T	2202.00
注	ウロミテキサン注100mg	(V)	7.0-8.0	本	460.00
	ウロミテキサン注400mg	(V)	7.0-8.0	本	1066.00
	タチオン注射用200mg	1/2-1A(M, V)	5.0-7.0	A	102.00
	デスフェールバイアル[500mg]	2V分2(M, D)	3.5-5.0	瓶	1733.00
	デトキソール10%20mL	1/2-1A(V)	7.5-8.5	A	520.00
	パム注射液[500mg]	1回2A(V)	3.0-5.0	A	427.00
	ブリディオ静注200mg	添付文書参照			
	メイロン-P[20mL]	1-3A(V)	7.6-8.6	A	92.00
	メイロン250mL	20-60mL(V)	7.6-8.6	袋	252.00
	レボホリナート 25mg 注「NP」	添付文書参照	6.8-8.2	瓶	1685.00
	レボホリナート 100mg 注「NP」	添付文書参照	6.8-8.2	瓶	5922.00
	ロイコボリン注3mg0.3%1ml	(M)	6.5-8.5	A	516.00

393 習慣性中毒用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	シアナマイド液「Wf」	添付文書参照		mL	8.50

394 痛風治療剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ウラリット錠	6-12T分3-4	粉○	T	11.80
	ウラリット-U	3-6g分3-4		g	23.10
	コルヒチン錠[0.5mg]	6-8T分6-8	粉△光	T	8.50
	ザイロリック錠[100mg]	2-3T分2-3	粉○	T	27.00
	ユリノーム50mg	維持:1-3T	粉△光	T	30.70

薬効別一覧

395酵素製剤		用法用量	備考	単	薬価
注	ウロナーゼ注6万	(V, D)	6.5-7.5	瓶	3219.00
	クリアクター注40万	27,501IU/kg静注	4.8-5.4	瓶	52484.00
	グルトパ2400万単位	(V, D)	6.8-7.8	瓶	232088.00
	グルトパ600万単位	(V, D)	6.8-7.8	瓶	58532.00
	リプレガル点滴静注用3.5mg	有 0.2mg/kg 隔週		瓶	355725.00
外	ブロメライン軟膏(20g)	1日1回		g	24.90

396糖尿病用剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アクトス錠30	1T分1	粉○	T	158.00
	アマリール1mg錠	維持:1-4T	粉○	T	22.30
	アマリール3mg錠	維持:0.25-1T	粉○	T	51.90
	エクア錠50mg	2T分2or1T朝		T	104.70
	グリミクロン錠[40mg]	1-3T分1-2	粉○	T	27.80
	グルコバイOD錠50mg	6T分3食直前	粉×変色	T	25.40
	グルファスト錠10mg	3T毎食直前	粉○	T	53.40
	ジャヌビア錠50mg	1日1回(Cr確認)		T	189.30
	セイブル錠50mg		3T毎食直	T	52.40
	ダオニール1. 25mg	1-2T 8Tまで	粉○	T	8.10
	ダオニール2. 5mg	0.5-1T 4Tまで	粉○	T	14.40
	ネシーナ錠25mg	1日1回1T		T	209.40
	ブタマイド	2-4T分1-2	粉○	T	8.50
	メトグルコ錠250mg	3-6T分2-3 Max9		T	9.20

薬効別一覧

399他に分類されない代謝性医薬品	用法用量	備考	単	薬価
内 イムラン錠[50mg]	維持0.5-1mg/kg	粉△	T	162.70
エビスタ錠60mg	1錠分1	粉×	T	132.20
キネダック錠[50mg]	3T分3(食前)	粉△退色	T	136.10
ダイドロネル錠200	添付文書参照	粉○	T	426.60
トリノシン腸溶錠20mg	6-9T分3	粉×腸溶	T	5.90
トリノシン顆粒10%	1.2-1.8g分3		g	20.90
ネオーラルカプセル10mg	有 添付文書参照	粉×	C	137.10
ネオーラルカプセル25mg	添付文書参照	粉×	C	287.70
ネオーラルカプセル50mg	添付文書参照	粉×	C	503.40
ピアーレDS95% ^o (6.8g/包)	3-6包 分1-3		g	6.20
フォイパン錠[100mg]	3-6T分3	粉△苦み	T	104.90
フォサマック錠35mg	週1回1T起床時	粉×	T	745.10
ブレディニン錠50	添付文書参照	粉△吸湿	T	321.00
プログラフカプセル0.5mg	添付文書参照		C	488.60
ラクツロースシラップ60%	30-60mL分2-3		mL	6.20
リウマトレックスカプセル2mg	添付文書参照		C	320.10
レグパラ錠25mg	有 1日1回 極量100		T	535.10
注 プログラフ注射液5mg	添付文書参照	4.5-7.5	A	6262.00

薬効別一覧

339その他の血液・体液用薬(抗血小板剤)		用法用量	備考	単	薬価
内	プラビックス錠75mg		1日1回1T	T	275.80

399他に分類されない代謝性医薬品		用法用量	備考	単	薬価
内	プログラフ顆粒0.2mg			包	232.90
	ボノテオ錠1mg	1T分1起床時		瓶	1,056.00
注	アデホスLコーワ注40mg	(V、D)	8.5-9.5	A	62.00
	エスポー注射液750シリンジ	(V)	5.5-6.5	筒	1115.00
	エスポー注射液1500シリンジ	(V)	5.5-6.5	筒	1937.00
	エスポー3000注射液シリンジ	(V)	5.5-6.5	筒	3406.00
	エスポー6000皮下用シリンジ	(C)	5.5-6.5	筒	9173.00
	エスポー12000皮下用シリンジ	(C)	5.5-6.5	筒	16013.00
	エスポー24000皮下用シリンジ	(C)	5.5-6.5	筒	26260.00
	エラスポール100[注射用]	(D)	7.5-8.5	瓶	5435.00
	エルシトニン注20Sディスポ 1mL	1A/W(M)	5.0-6.5	筒	1265.00
	エルシトニン注40単位	(M、V)	5.0-6.5	A	1288.00
	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	(D)	7.7-8.7	瓶	1517.00
	コアヒビター注射用10	(D)	3.5-4.0	瓶	497.00
	コアヒビター注射用50	(D)	3.5-4.0	瓶	1320.00
	スベニールディスポ関節注25mg	1回1キット	5.3-6.8	筒	1586.00
	ゾメタ注4mg	(D)	5.7-6.7	瓶	37946.00
	トリノシンS注射液10mg	(M、V、D)	8.5-9.5	本	61.00
	ネスプ静注用15 μ gシリンジ	(V)		筒	4358.00
	ネスプ静注用10 μ gシリンジ	有(V)		筒	3086.00
	ネスプ静注用20 μ gシリンジ	(V)		筒	5564.00
	ネスプ静注用30 μ gシリンジ	(V)		筒	7823.00
	ネスプ静注用40 μ gシリンジ	(V)		筒	9966.00
	ネスプ静注用60 μ gシリンジ	(V)		筒	14031.00
	ネスプ静注用120 μ gシリンジ	(V)		筒	24065.00
	ミラクリッド注射液5万単位	(V、D)	4.8-5.8	A	1499.00
	ミラクリッド注射液10万単位	(V、D)	4.8-5.8	A	2711.00
	ミルセラ注シリンジ75 μ g	添付文書参照		筒	17608.00
	ミルセラ注シリンジ100 μ g	添付文書参照		筒	22445.00
	ミルセラ注シリンジ150 μ g	添付文書参照		筒	31600.00
	ミルセラ注シリンジ200 μ g	添付文書参照		筒	40281.00
	レミナロン注射用100mg	(V、D)	4.0-5.5	瓶	295.00

薬効別一覧

注 レミナロン注射用500mg	(V、D)	4.0-5.5	瓶	1325.00
-----------------	-------	---------	---	---------

薬効別一覧

421アルキル化剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アルケラン錠[2mg]	添付文書参照	粉×	T	214.60
	エストラサイトカプセル		粉×	C	419.60
	エンドキサンP錠[50mg]	2-4T	粉△	T	38.80
	マブリン散(10mg/g)	添付文書参照		g	131.80
注	アルケラン静注用50mg	添付文書参照	6.0-7.0	瓶	9987.00
	イホマイド1g注射用	1.5-3g(V, D)	4.5-6.5	瓶	3725.00
	エンドキサン注射用500mg	(V)	5.0-6.0	瓶	871.00
	サイメリン注射用50mg	(V, D)	4.0-6.0	瓶	13203.00
	サイメリン注射用100mg	(V, D)	4.0-6.0	瓶	26087.00
	ダカルバジン注用 100mg	添付文書参照	3.0-4.0	瓶	4365.00

薬効別一覧

422代謝拮抗剤		用法用量	備考	単	薬価
内	スタラシドカプセル50	2-6C	粉△	C	451.00
	スタラシドカプセル100	1-3C	粉△	C	790.50
	ゼローダ錠300	有 添付文書参照	粉×	T	350.50
	ティーエスワンカプセル20	添付文書参照		C	675.60
	ティーエスワンカプセル25	添付文書参照		C	812.80
	ハイドレアカプセル500mg	添付文書参照	粉×	C	342.10
	フルダラ錠10mg	有	40mg/m2	T	3637.80
	メソトレキセート錠2.5mg	添付文書参照	粉×	T	43.80
	ユーエフティ	3-6C分2-3	粉△	C	285.90
	ユーエフティーE腸溶顆粒 100mg	1.5-3g分2-3			
	ユーエフティーE腸溶顆粒 200mg	1.5-3g分2-3			
注	アリムタ注射用100mg		6.6-7.8	瓶	57358.00
	アリムタ注射用500mg	500mg/m2 20日	6.6-7.8	瓶	240300.00
	キロサイド20mg	(C, M, V, D)	7.5-9.0	A	455.00
	キロサイド40mg	(C, M, V, D)	7.5-9.0	A	858.00
	キロサイド100mg	(C, M, V, D)	7.5-9.0	A	2180.00
	キロサイド200mg	(C, M, V, D)	7.5-9.0	A	3411.00
	キロサイドN注1g	(D)	8.0-9.3	瓶	13418.00
	サンラビン注射用150mg	(D)	5.5-7.0	瓶	3561.00
	サンラビン注射用200mg	(D)	5.5-7.0	瓶	4722.00
	サンラビン注射用250mg	(D)	5.5-7.0	瓶	5910.00
	ジェムザール注射用200mg	(D)	約3	瓶	5404.00
	ジェムザール注射用1g	(D)	約3	瓶	25179.00
	5-FU協和[250mg]	(V, D)	8.2-8.6	本	394.00
	フルダラ静注用50mg		7.2-8.2	瓶	37131.00
	メソトレキセート注射用5mg	(M, V, D, 髄)		瓶	920.00
	メソトレキセート注射用50mg	(M, V, D, 髄)		瓶	3052.00
	メソトレキセート注射液200mg	(M, V, D, 髄)		瓶	10891.00

薬効別一覧

423抗腫瘍性抗菌薬製剤	用法用量	備考	単	薬価
注 アクラシノン注射用[20mg]	(V, D)	5.0-6.5	瓶	3791.00
アドリアシン注用10mg	(V)	5.0-6.0	瓶	2326.00
イダマイシン注[5mg]	(V)	5.0-7.0	瓶	14882.00
コスメゲン(0.5mg/瓶)	(V, D)	5.5-7.5	瓶	1961.00
ダウノマイシン[20mg]	(V, D)	5.0-6.5	瓶	1821.00
テラルビシン注射用10mg	(V, A)	5.0-6.5	瓶	7038.00
テラルビシン注射用20mg	(V, A)	5.0-6.5	瓶	13643.00
ドキシル注20mg	婦50mg/m ²		瓶	96543.00
ファルモルビシン注[10mg]	(V)	4.5-6.0	瓶	5525.00
ファルモルビシン注射用50mg	(V)	4.5-6.0	瓶	25052.00
ブレオ注射用5mg	(C, M, V, A)	4.5-6.5	瓶	1979.00
ブレオ注射用15mg	(C, M, V, A)	4.5-6.5	瓶	5767.00
ブレオ注射用30mg	(C, M, V, A)	4.5-6.5	瓶	11063.00
ペブレオ注5mg	(M, V, A)	4.5-6.0	瓶	4253.00
ペブレオ注10mg	(M, V, A)	4.5-6.0	瓶	7497.00
マイトマイシン協和S 2mg	(V, A)	5.5-7.0	瓶	481.00
マイトマイシン協和S 10mg	(V, A)	5.5-7.0	瓶	2272.00
マイロターグ注射用5mg	(D)	7.0-7.6	瓶	241096.00

薬効別一覧

424抗腫瘍性植物成分製剤	用法用量	備考	単	薬価
内 ベプシドS 25	添付文書参照	粉×	C	903.20
ベプシドS 50	添付文書参照	粉×	C	1685.50
注 アブラキサン点滴静注用 100mg	260mg/m ² 20日	6.0-7.5		
イリテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	添付文書参照	3.0-4.0	瓶	4884.00
イリテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	添付文書参照	3.0-4.0	瓶	11663.00
エクザール[10mg]	(V)	4.0-5.0	瓶	3274.00
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	(D)	3.3-4.3	瓶	4499.00
オンコビン[1mg]	(V)	4.0-6.0	瓶	3252.00
タキソテール注20mg	添付文書参照	6.0-8.0	瓶	19660.00
タキソテール注80mg	添付文書参照	6.0-8.0	瓶	67304.00
ナベルビン注10 1mL	(V)	3.3-3.8	瓶	6085.00
ナベルビン注40 4mL	有 (V)	3.3-3.8	瓶	21806.00
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	添付文書参照	4.3-6.3	瓶	8644.00
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	添付文書参照	4.3-6.3	瓶	25543.00
フィルデシン注射用1mg	(V)	3.5-5.5	瓶	5083.00
フィルデシン注射用3mg	(V)	3.5-5.5	瓶	13687.00
ベプシド注[100mg]	(D)	3.3-4.3		

薬効別一覧

429その他の腫瘍用薬		用法用量	備考	単	薬価
内	アリミデックス錠[1mg]	1T分1		T	573.40
	アロマシン錠25mg	1T分1	粉×	T	590.00
	イレッサ錠250	1T分1		T	6526.20
	オダイン錠[125mg]	3T分3	粉△	T	336.30
	カソデックス錠	1T分1	粉×	T	1042.60
	グリベック錠100mg			T	2749.00
	サレドカプセル100	1C眼前 Max4C		C	6570.40
	タイケルブ錠250mg	1250mg分1 避食		錠	11620.70
	ネクサバール錠200mg	4T分2 減量基準		錠	5426.20
	ノルバデックス[20mg]	1T分1 2T迄	粉△	T	369.50
	ヒスロンH200	添付文書参照	粉△	T	316.10
	フェアストン錠40	添付文書参照	粉△	T	428.90
	フェアストン錠60	添付文書参照	粉△	T	646.40
	フェマーラ錠2.5mg	1日1回2.5mg		T	655.40
	ベサノイドカプセル[10mg]	6-9C分3	粉×	C	745.00
	ベスタチンカプセル30	1C分1	粉○	C	1561.40
	ペラゾリン細粒(400mg)	1日4包 分1-2		包	2214.70
	レブラミドカプセル5mg			C	8861.00
注	アクブラ静注用10mg	(D)	6.5-7.5	瓶	6217.00
	アクブラ静注用50mg	(D)	6.5-7.5	瓶	28848.00
	アクブラ静注用100mg	(D)	6.5-7.5	瓶	52930.00
	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	有 5or10mg/kg/回	5.9-6.3	瓶	49959.00
	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	有 5or10mg/kg/回	5.9-6.3	瓶	190253.00
	アービタックス注射液100mg	添付文書参照	5.3-5.7	瓶	35894.00
	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	(D)	5.5-6.5	瓶	3727.00
	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	(D)	5.5-6.5	瓶	9437.00
	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	(D)	5.5-6.5	瓶	21014.00
	シスプラチン注10mg「日医工」	(D)	2.0-5.5	瓶	1306.00
	シスプラチン注50mg「日医工」	(D)	2.0-5.5	瓶	5492.00
	ノバントロン注(2mg/mL)5mL	(V, D)	3.0-4.5	瓶	23056.00
	ハーセプチン注射用150mg	(D)	5.8-6.4	瓶	56110.00
	ピシバニール1KE	(C, M)	6.0-7.5	瓶	3314.00
	ピシバニール5KE	(C, M)	6.0-7.5	瓶	7496.00
	ビダーザ注射用100mg	75 mg/m ² d1-7/		瓶	49993.00

薬効別一覧

注 ベクティビックス点滴静注100mg	(D) 6mg/kg 2W/	5.6-6.0	瓶	75567.00
ミリプラ動注用70mg	添付文書参照			46,623.00
リツキサン注10mg/mL 100mg 10mL	(D)	6.2-6.8	瓶	42832.00
リツキサン注10mg/mL 500mg 50mL	(D)	6.2-6.8	瓶	209585.00
ロイナーゼ注5000K単位	50-200KE/kg(D)	6.5-7.5	瓶	2525.00
ロイナーゼ注10000K単位	50-200kE/kg(D)	6.5-7.5	瓶	4955.00

薬効別一覧

441抗ヒスタミン剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アリメジンシロップ(0.5mg/mL)	15-20mL分3-4		mL	2.52
	タベジール散(1mg/g)	外 2g分2		g	10.20
	ピレチア錠25mg	添付文書参照	粉△光	T	5.70
	ピレチア細粒(100mg/g)	添付文書参照		g	6.20
	ポララミン錠2mg	1-4T分1-4	粉×	T	5.90
	レスタミンコーワ錠10mg			T	6.10
注	ポララミン注5mg	1日1回1A(C,M,V)	4.0-6.0	本	60.00

442刺激療法剤		用法用量	備考	単	薬価
内	リドーラ錠[3mg]	2T分2	粉×	T	103.90
	リマチル100mg	3T→1-3T	粉×刺激	T	74.90
注	シオゾール10mg	(M)	6.0-7.0	本	370.00

薬効別一覧

449その他のアレルギー用薬		用法用量	備考	単	薬価
内	アイピーディカプセル100	3C分3	服用時開封	C	62.20
	アレグラ錠60mg	2T分2		T	82.30
	アレロック錠5	2T分2	粉△苦		
	オノンカプセル[112.5mg]	4C分2	粉○	C	66.90
	キプレス錠10	1Tvds		T	252.70
	ケタスカプセル10mg	2C分2or3C分3	開封/ミ可	C	27.80
	ザイザル錠5mg	1T分1(Max2T)		T	121.90
	ザジテン[1mg]	2C(朝、眠前)	粉○	C	63.00
	ザジテンシロップ(0.2mg/mL)	有 0.06mg/kg分2		mL	23.40
	セルテクトドライシロップ(20mg/g)	外 1mg/kg分2		g	110.10
	タリオン錠10	2T分2	粉○	T	57.90
	リザベンカプセル100mg	3C分3	粉×	C	57.40
	リザベンドライシロップ(50mg/g)	5mg/kg分3		g	61.20
注	アレルギー治療エキス				
	アレルギーハウスダストエキス1:1000				

薬効別一覧

520漢方製剤	用法用量	備考	単	薬価
内 クラシ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	6g分2		g	9.00
クラシ猪苓湯エキス細粒	6g分2		g	17.00
クラシ温清飲エキス細粒	6g分2		g	15.50
クラシ十全大補湯エキス細粒	7.5g分2		g	16.80
クラシ黄连解毒湯エキス細粒	6g分2		g	15.70
クラシ葛根湯エキス細粒	7.5g分2		g	7.70
クラシ加味逍遥散料エキス細粒	6g分2		g	21.10
クラシ桂枝茯苓丸料エキス細粒	6g分2		g	10.90
クラシ五苓散料エキス細粒	6g分2		g	15.20
クラシ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒	6g分2		g	25.20
クラシ柴朴湯エキス細粒	7.5g分2-3		g	34.00
クラシ柴苓湯エキス細粒	8.1g分2		g	53.60
クラシ芍薬甘草湯エキス細粒	6g分2		g	9.00
クラシ十味敗毒湯エキス細粒	6g分2		g	15.30
クラシ小柴胡湯エキス細粒	6g分2		g	35.60
クラシ小青竜湯エキス細粒	6g分2		g	20.60
クラシ桃核承気湯エキス細粒	6g分2		g	9.80
クラシ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細	7.5g分2	在庫無	g	8.80
クラシ当帰芍薬散料エキス細粒	6g分2		g	11.40
クラシ八味地黄丸料エキス細粒	6g分2		g	11.90
クラシ半夏厚朴湯エキス細粒	6g分2		g	10.30
クラシ半夏瀉心湯エキス細粒	6g分2		g	23.90
クラシ白虎加人参湯エキス細粒	6g分2		g	28.40
クラシ防己黄耆湯エキス細粒	7.5g分2-3	在庫無	g	8.40
クラシ防風通聖散エキス細粒	7.5g分2		g	7.60
クラシ補中益気湯エキス細粒	7.5g分2		g	23.70
クラシ苓桂朮甘湯エキス細粒	6g分2		g	8.40

薬効別一覧

520漢方製剤		用法用量	備考	単	薬価
内 シテイ		10g/日		g	1.41
	ツムラ温経湯エキス顆粒医療用	7.5g分2-3	在庫無	g	24.90
	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒医療用	7.5g分2-3	在庫無	g	21.40
	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒医療用	7.5g分2-3		g	11.10
	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒医療用	7.5g分2-3		g	12.30
	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒医療用	7.5g分2-3	在庫無	g	27.10
	ツムラ小建中湯エキス顆粒医療用	15g分2-3		g	7.80
	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒医療用	7.5g分2-3		g	5.30
	ツムラ大建中湯エキス顆粒医療用	15g分2-3		g	10.10
	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒医療用	7.5g分2-3	在庫無	g	6.20
	ツムラ釣藤散エキス顆粒医療用	7.5g分2-3		g	16.10
	ツムラ通導散エキス顆粒医療用	7.5g分2-3		g	9.90
	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒医療用	9g分2-3		g	19.10
	ツムラ六君子湯	15g分2-3		g	21.00
	ツムラ抑肝散エキス顆粒			g	12.30

90その他の生薬および漢方処方に基づく医薬		用法用量	備考	単	薬価
内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	3-6g分3		g	13.50

薬効別一覧

61抗菌薬(セフェム系)		用法用量	備考	単	薬価
内	セフゾンカプセル100mg	3C分3	粉○	C	70.60
	セフゾン細粒小児用(100mg/g)	9-18mg/kg分3		g	129.60
	バナンドライシロップ(50mg/g)	6-9mg/kg分2-3		g	82.00
	フロモックス錠100mg	3T分3	粉△遮光	T	61.70
	メリアクトMS小児用細粒(100mg/g)	9mg/kg分3		g	243.40
注	セファメジンα注射用 1g	1g分2(M、V、D)	4.6-6.3	瓶	428.00
	セファメジンα点滴用キット1g	1g分2(M、V、D)	4.6-6.3	K	797.00
	セファメジンα注射用 2g	1g分2(M、V、D)	4.6-6.3	瓶	853.00
	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	(V、D)14日以内	4.0-6.0	瓶	790.00
	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	1-2g分1-2(V、D)	6.0-8.0	瓶	367.00
	セフメタゾールNa点滴静注用バッグ1g	1-2g分2(V、D)	4.0-6.0	K	761.00
	静注用セフメタゾールNa(1gバイアル)	1-2g分2(V、D)	4.0-6.0	瓶	320.00
	静注用セフメタゾールNa(2gバイアル)	1-2g分2(V、D)	4.0-6.0	瓶	578.00
	マキシピーム注1g	(V、D)14日以内	4.0-6.0	瓶	1083.00

61抗菌薬(ペニシリン系)		用法用量	備考	単	薬価
内	サワシリンカプセル250mg	3-4C分3-4	粉△臭い	C	14.10
	サワシリン細粒(100mg/g)	20-40mg/kg分3-4		g	13.10
	ユナシン錠[375mg]	2-3T	粉×湿	T	61.90
注	結晶ペニシリンGカリウム「万有」100万単位	0.6-2.4V(M)	5.5-7.5	瓶	223.00
	ゾシン静注用4.5	1日3回	5.0-5.6(生)	瓶	2626.00
	ビクシリンS注射用100mg	(M)	8.0-10.0	瓶	65.00
	ビクシリン[注射用]1g	(D、V、M)	8.0-10.0	瓶	379.00
	ビクシリン[注射用]2g	(D、V、M)	8.0-10.0	瓶	685.00
	ピシリバクタ静注用1.5g	3-6g分2(V、D)	8.0-10.0	瓶	519.00

薬効別一覧

61 抗菌薬(アミノ配糖体系)		用法用量	備考	単	薬価
内	カナマイシンカプセル「明治」250mg	8-16C分4	粉○苦み	C	42.30
注	ゲンタシン注60	2-3A(D,M)	4.0-6.0	A	346.00
	トブラシン注小児用10mg	小児3mg/kg	5.0-7.0	本	104.00
	パニマイシン注射用 100mg	1V(M,D)	6.0-8.0	瓶	706.00
	ハベカシン注射液 75mg	150-200mg(M,D)	6.0-8.0	A	4534.00
	ハベカシン注射液 100mg	150-200mg(M,D)	6.0-8.0	A	4915.00
	硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	0.5-2A(D,M)	6.0-7.5	本	673.00
	硫酸ストレプトマイシン明治1g	1g週2-3回(M)	5.0-7.0	瓶	395.00

61 抗菌薬(テトラサイクリン系)		用法用量	備考	単	薬価
内	ミノペン錠100	1-2T→2T	粉△苦湿	T	57.60
	ミノマイシン顆粒(20mg/g)	2-4mg/kg分1-2		g	21.40
注	ミノマイシン点滴静注用[100mg]	1-2V(D)	2.0-3.5	瓶	525.00

61 抗菌薬(ペネム系)		用法用量	備考	単	薬価
内	ファロム錠200mg	3T分3	粉△苦臭	T	72.40
注	メロペン点滴用0.5g	0.5-1g分2-3(D)	6.7-8.7		

61 抗菌薬(マクロライド系)		用法用量	備考	単	薬価
内	アセチルスピラマイシン錠200mg	有 4-6T分4-6	粉△苦み	T	33.60
	エリスロシン錠200mg	4-6T分4-6	粉×	T	15.40
	クラリス錠200	2T分2	粉△苦み	T	96.60
	クラリス錠50小児用	外 10-15mg/kg	粉△苦み	T	63.80
	クラリスドライシロップ小児用(100mg/g)	10-15mg/kg		g	104.60
	ジスロマックSR成人用DS2g	空腹時1回	粉△苦	瓶	2069.00

薬効別一覧

61 抗菌薬(抗真菌薬)		用法用量	備考	単	薬価	
内	ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	—	2-4mL分2-4		mL	58.00
	ブイフェンド錠50mg	有	添付文書参照	粉×	T	1107.60
	ブイフェンド錠200mg	有	添付文書参照	粉×	T	3407.60
注	アムビゾーム点滴静注用50mg	有	2.5~6mg/kg 1	5.0-6.0	瓶	9538.00
	ファンガード点滴用50mg	—	1-3V(V)	4.5-8.0	瓶	6617.00
	ファンギゾン[50mg]	—	(C、V、D)	7.2-8.0		
	ブイフェンド注200mg	—	添付文書参照	5.5-7.0	瓶	11661.00

624 合成抗菌剤		用法用量	備考	単	薬価	
内	アベロックス錠400mg	—			T	491.80
	オゼックス錠150	有	2-3T分2-3	粉○	T	100.20
	クラビット錠250mg	—	2T分1	粉△光	T	206.50
注	シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL	—	2V分2(D)30分以	3.9-4.5	袋	2046.00

薬効別一覧

61 抗菌薬(その他)		用法用量	備考	単	薬価
内	塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」	4-6V分1-4		瓶	1990.50
	ホスミン錠500	4-6T分4-6	粉○	T	68.30
	ホスミンドライシロップ [®] 400(400mg/g)	40-120mg/kg		g	91.20
注	ザイボックス錠600mg	1T12h毎		T	12935.90
	ザイボックス錠600mg	1T12h毎		袋	17779.00
	ザイボックス注射液600mg	1P12h毎	4.4-5.2	袋	17779.00
	ダラシンS注 600mg	1-2A分2-4(M, D)	6.0-7.0	A	640.00
	テイコプラニン点滴静注用400mg「F」	(D)	6.3-7.7	瓶	5292.00
	バンコマイシン0.5g点滴静注用「MEEK」	薬剤部照会		瓶	1634.00

621 サルファ剤		用法用量	備考	単	薬価
内	アザルフィジンEN錠500mg	2T分2	粉×	T	73.10
外	サラゾピリン坐剤[500mg]	1回1-2個1日2回		個	128.10

622 抗結核剤		用法用量	備考	単	薬価
内	イスコチン錠[100mg]	2-5T分1-3	粉△	T	9.60
	エブトール250mg錠	3-4T分1-2	粉× 苦湿	T	20.50
	ピラマイド	1.5-2g分1-3		g	31.90
	リファジンカプセル[150mg]	3C分1	粉○	C	33.60
注	イスコチン注[100mg]	2-5A(M, V)	6.5-7.5	A	94.00

薬効別一覧

61抗菌薬(抗真菌薬)		用法用量	備考	単	薬価
内	イトリゾールカプセル50	1-4C分1	粉×	C	463.10
	ジフルカンカプセル100mg	0.5-2C分1	粉△苦み	C	1056.40
	ラミシール錠125mg	1T分1	粉×光	T	228.60
注	イトリゾール注1%[200mg]	ローディングドース要	4.2-5.2	A	14042.00
	プロジフ静注液100	(V)	8.5-9.5	瓶	5255.00
	プロジフ静注液200	(V)	8.5-9.5	瓶	9810.00
	プロジフ静注液400	(V)	8.5-9.5	瓶	18657.00

625抗ウイルス剤		用法用量	備考	単	薬価
内	コペガス錠200mg	添付文書参照	粉×	T	767.30
	ゼフィックス錠100mg	1T分1	粉△苦味	T	622.00
	ゾビラックス錠200	単純:5T分5	粉△1W内	T	265.40
	タミフルカプセル75	2C分2 5日間		C	309.10
	タミフルドライシロップ3%	2mg/kg 2回/日		g	237.20
	バラクルード錠0.5mg	1日1回1錠空腹時	粉×	T	1032.30
	バリキサ錠450mg	有 4T分2		T	2942.90
	バルトレックス錠500	6T分3		T	559.00
	ヘプセラ錠10mg	1回1T	粉×	T	1252.10
	レベトールカプセル200mg	3-4C分2	開封不可	C	764.60
注	デノシン点滴静注用	添付文書参照	10.8-11.4	瓶	12705.00
	ビクロックス250mg点滴静注用	15mg/kg/日(D)	10.4	A	1714.00
外	アラセナA軟膏(5g)	1日1-4回		g	351.70
	イナビル吸入粉末剤20mg	2キット1回(10歳未			
	ゾビラックス軟膏5%(5g)	1日数回		g	367.60

629その他の化学療法剤		用法用量	備考	単	薬価
内	バクタ錠	4T分2	粉△	T	83.50
	バクタ顆粒	4g分2		g	85.40
注	バクトラミン注5ml		9.1-9.9	A	607.00

薬効別一覧

631ワクチン類		用法用量	備考	単	薬価
注 アクトヒブ		添付文書参照		瓶	薬価未収載
インフルエンザHAワクチン		添付文書参照		A	161.00
おたふくかぜワクチン(乾燥弱毒生)		添付文書参照		瓶	薬価未収載
サーバリックス		添付文書参照		瓶	薬価未収載
3種混合ワクチン(沈降精製)		添付文書参照		瓶	薬価未収載
ジェービックV(日本脳炎予防)		添付文書参照		瓶	薬価未収載
水痘ワクチン(乾燥弱毒生)		添付文書参照		瓶	薬価未収載
ニューモバックスNP		添付文書参照		瓶	4761.00
BCGワクチン(乾燥)		添付文書参照		瓶	薬価未収載
ビームゲン0.25mL		(C)	5.5-8.0	瓶	2155.00
ビームゲン0.5mL		(C, M)	5.5-8.0	瓶	2481.00
風しんワクチン(乾燥弱毒生)		添付文書参照		瓶	薬価未収載
プレベナー水性懸濁皮下注		添付文書参照		瓶	薬価未収載
麻しんワクチン(乾燥弱毒生)		添付文書参照		瓶	薬価未収載

632毒素及びトキソイド類		用法用量	備考	単	薬価
注 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド“化		(C, M)		瓶	薬価未収載
沈降破傷風トキソイド 0.5mL		(C, M)		瓶	404.00

薬効別一覧

634血液製剤類	用法用量	備考	単	薬価
注 アドベイト注射用 1000	添付文書参照		瓶	73867.00
献血アルブミン5-ニチャク(250ml)	(V、D)	6.4-7.4	瓶	6845.00
HBグロブリン—ニチャク200単位	(M)		瓶	8657.00
献血アルブミン25%50mLニチャク	(V、D)	6.4-7.4	瓶	6551.00
抗D人免疫グロブリン—Wf	(M)		瓶	19651.00
新鮮凍結血漿 80mL	添付文書参照		袋	5,507.00
新鮮凍結血漿 160mL	添付文書参照		袋	11,014.00
赤血球M・A・P「日赤」照射 140mL			袋	
赤血球M・A・P「日赤」照射 280mL			袋	
テタノブリンIH[250単位]	(V、D)	6.4-7.2	瓶	3990.00
ノンスロン1500注射用〔献血〕	DIC:1V(V、D)	6.5-8.0	瓶	84564.00
ハプトグロビン注—Wf	1回2V(D)	6.0-7.5	瓶	46759.00
フィブロガミンP	1-5V(V)	6.5-7.5	瓶	8664.00
ベニロン—I「献血」2.5g	1回1-2V(V、D)	6.4-7.2	瓶	25844.00
ヘブスブリン—IH1000単位	1-2V(V)		瓶	37831.00

薬効別一覧

639その他の生物学的製剤		用法用量	備考	単	薬価
注	アドバフェロン注射液1200	(C)	6.8-7.2	瓶	11359.00
	アドバフェロン注射液1800	(C)	6.8-7.2	瓶	16445.00
	イントロンA注射用300	(M)		瓶	4705.00
	イントロンA注射用600	(M)		瓶	9109.00
	イントロンA注射用1000	(M)		瓶	14729.00
	スミフェロン300	(M)	6.0-7.5	瓶	7089.00
	スミフェロン600	(M)	6.0-7.5	瓶	13679.00
	精製ツバルクリン一般診断用0.25 μ g	(C)		瓶	834.00
	ソリリス点滴静注300mg	添付文書参照	6.8-7.2	瓶	577229.00
	フェロン300	(V,D)	4.5-7.0	瓶	23938.00
	フェロン600	(V,D)	4.5-7.0	瓶	45495.00
	ペガシス皮下注90 μ g	1回/W (C)	5.5-6.5	瓶	13977.00
	ペグイントロン50 μ g	(M)		瓶	15206.00
	ペグイントロン100 μ g	(M)		瓶	29550.00
	ペグイントロン150 μ g	(M)		瓶	44135.00
外	イムノブラダー一膀注用	1A/週		瓶	20163.80

641抗原虫剤		用法用量	備考	単	薬価
内	フラジール内服錠[250mg]	2T分2(10日)	粉△苦光	T	37.30

642駆虫剤		用法用量	備考	単	薬価
内	コンバントリンドライシロップ [®] (100mg/g)	10mg/Kg		g	78.50

711賦形剤		用法用量	備考	単	薬価
内	乳糖			g	1.99
	バレイシヨデンポン			g	0.81

薬効別一覧

712軟膏基剤		用法用量	備考	単	薬価
外	オリーブ油			mL	1.66
	精製ラノリン			g	2.17
	ソルベース			g	2.80
	白色ワセリン			g	0.92
	流動パラフィン	30-90mL浣腸		mL	0.93

713溶解剤		用法用量	備考	単	薬価
注	注射用水 広口開栓 1000mLP			瓶	211.00
	注射用蒸留水20mL	(V)	7.0	本	61.00
	ワッサー[フソー] 100mL			瓶	95.00
外	滅菌精製水			mL	0.34

714矯味矯臭着色剤		用法用量	備考	単	薬価
内	単シロップ			mL	0.85
	ハチミツ			g	1.20
	ハッカ油			mL	9.10

719その他の調剤用薬		用法用量	備考	単	薬価
外	ホスコH-15			g	4.06

721X線造影剤		用法用量	備考	単	薬価
注	イオハミロン370シリンジ 80mL	(V)	6.5-7.5		11,294.00

薬効別一覧

721X線造影剤		用法用量	備考	単	薬価
内	ガストログラフィン(100mL)	1回60mL		mL	17.00
	バリテスターA240散 98.5% 350g			g	1.48
	バリトゲン—デラックス			g	1.48
	バリトゲンゾル200mL			mL	1.48
	マグコロールPパウチ入り:100g				
注	イオメロン300 50mL	(D)			
	イオメロン300 100mL	(D)			
	イオメロン300シリンジ100mL	(D)		筒	11360.00
	イオメロン350 50mL	(D)			
	イオメロン350シリンジ100mL	(D)		筒	13144.00
	イソビスト300 10mL	(V)		瓶	8543.00
	ウログラフィン60%20mL	(V)		A	541.00
	オムニパーク240(脳槽・脊髄用)10mL				1,291.00
	オイパロミ300 50mL	(D)			
	オイパロミン300 100mL	(D)			
	オムニパーク300シリンジ80mL	(D)			
	オムニパーク300シリンジ100mL	(D)			
	オムニパーク300シリンジ150mL	(D)			
	オイパロミン350 20mL	(D)			
	オイパロミン350 50mL	(D)			
	オイパロミン350 100mL	(D)			
	ビリスコピンDIC50	(D)		瓶	2626.00
	リピオドールウルトラフルイド			本	3102.00

薬効別一覧

722機能検査用試薬		用法用量	備考	単	薬価
内	PFD内服液腓外分泌機能検査用	1回1A		A	975.20
注	インジゴカルミン注第一	1-2A(V)			
	LH—RH注タナベ[0.1mg]	1A(C, M, V)		A	3960.00
	グルカゴンG・ノボ(1USP)	(M, V)	2.5-3.5	瓶	2633.00
	グルカゴンG・ノボ(1USP)	(M, V)	2.5-3.5		
	ジアグノグリーン注[25mg]	(V)	5.0-7.0	瓶	618.00
	ヒルトニン注射液0.5mg	(C, M, V, D)	5.5-6.5	本	2375.00
	ヒルトニン注射液2mg	(C, M, V, D)	5.5-6.5	本	9598.00
	フェノールスルホンフタレイン注	(M, V)	6.0-7.6	本	94.00
外	アドエア125エアゾール120吸入用	1日2回1回2吸入		K	3392.60

9その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除		用法用量	備考	単	薬価
内	トレーランG75			瓶	201.30
	フェリセルツ(600mg/包)	1包 2包迄		包	973.80
	ボースデル内用液10	成人には1袋	3.5-6.0		
	ユービット錠	1回1T		T	3104.00
注	アレルゲンエキス「トリイ」診断用				
	EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	0.1mL/kg			13,652.00
	EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	0.1mL/kg			20,336.00
	ソナゾイド注射用16μL	懸濁液0.015mL/k			13,001.00
	フルオレサイト注射液1号	0.5-1A(V)	8.8-9.8	瓶	1211.00
	プロハンス注5mL	0.2mL/kg(V)		瓶	4096.00
	プロハンス注15mL	0.2mL/kg(V)		瓶	10126.00
	マグネビストシリンジ10mL	0.2mL/kg(V)	6.8-7.8	筒	7368.00
	マグネビストシリンジ15mL	0.2mL/kg(V)	6.8-7.8	筒	10057.00
	マグネビストシリンジ20mL	0.2mL/kg(V)	6.8-7.8	筒	13045.00
	リゾビスト注44.6mg1.6ml	(V)	5.5-7.0	瓶	18798.00
	レボビスト注射用	添付文書参照	4.0-5.5	瓶	11153.00
外	フローレス試験紙	1枚/眼		枚	14.70

薬効別一覧

762尖圭コンジローマ治療薬		用法用量	備考	単	薬価
外	ベセルナクリーム5%	1日1回週3回 16		包	1136.00

9他に分類されない治療を主目的としない医薬		用法用量	備考	単	薬価
内	ガスチーム	添付文書参照		g	121.00
	D-ソルビトール	有 必要量		mL	1.26
	ビジクリア錠	添付文書参照		T	54.80
注	アデノスキャン注60mg		4.5-7.5	瓶	13183.00
外	タココンブ(4.8cm x4.8cmハーフサイズ)			枚	31936.50
	タココンブ(9.5cm x4.8cmレギュラーサイズ)			枚	60091.80
	ノベクタンLスプレー(187g)	乾燥後噴霧			
	ベリプラストP コンビセット5ml	添付文書参照		組	79,843.10
	ボルヒール1mL	A, B液混合		組	15085.70
	ボルヒール3mL	A, B液混合		組	42244.10

薬効別一覧

811あへんアルカロイド系麻薬		用法用量	備考	単	薬価
内	MSコンチン錠10mg	20-120mg分2	粉×	T	247.90
	MSコンチン錠30mg	20-120mg分2	粉×	T	725.10
	塩酸モルヒネ錠 日本薬局方	添付文書参照	10mg/T	g	2226.00
	オキシコンチン錠5mg	10-80mg分2	粉×	T	149.60
	オキシコンチン錠10mg	10-80mg分2	粉×	T	279.20
	オキシコンチン錠40mg	10-80mg分2	粉×	T	965.20
	オキノーム散0.5% 2.5mg	添付文書参照		包	65.20
	オキノーム散0.5% 5.0mg	添付文書参照		包	130.40
	オキノーム散0.5% 10mg	添付文書参照		包	32.60
	オプソ内服液5mg	添付文書参照		包	122.40
	オプソ内服液10mg	添付文書参照		包	227.40
注	塩酸モルヒネ注射液10mg	(C, D)	2.5-5.0	A	306.00
	塩酸モルヒネ注射液50mg	(C, D)	2.5-5.0	A	1380.00
	モルヒネ注射液[塩酸]50mg	(C, D)	2.5-5.0	A	1380.00
外	アンペック坐剤10mg	2-12個 分2-4		個	322.90
	アンペック坐剤20mg	1-6個 分2-4		個	610.50

821合成麻薬		用法用量	備考	単	薬価
注	アルチバ静注用2mg	添付文書参照			2,534.00
	フェンタニル注射液0.1mg	添付文書参照	4.5-6.5		357.00
	フェンタニル注射液0.1mg	添付文書参照	4.5-6.5	A	1088.00
	フェンタニル注射液0.5mg/10ml	OP専用	4.5-6.5	A	1088.00
	ペチロルファン注射液	添付文書参照			
外	デュロテップMTパッチ2.1mg	1枚/3日		枚	1926.20
	デュロテップMTパッチ4.2mg	1枚/3日		枚	3467.80
	デュロテップMTパッチ8.4mg	1枚/3日		枚	6538.90
	デュロテップMTパッチ12.6mg	1枚/3日		枚	9356.60
	デュロテップMTパッチ16.8mg	1枚/3日		枚	12047.70

薬効別一覧

900その他		用法用量	備考	単	薬価
内	アンジュ21	経口避妊剤		T	自費
注	アレルギー対照液	対照用		瓶	薬価未収載
	アレルギー治療エキス希釈液	希釈用		瓶	薬価未収載
	ACD-A液 500mL	添付文書参照		袋	薬価未収載
外	血沈用チトラート	体外用		瓶	薬価未収載
	デブリサン 60g	創傷熱傷治療		個	薬価未収載
	ニコチネルTTS10	添付文書参照		枚	自費
	ニコチネルTTS20	添付文書参照		枚	自費
	ニコチネルTTS30	添付文書参照		枚	自費
	ニコレット	添付文書参照		個	自費
	マイクロフレーター	インター点鼻用		個	薬価未収載

ニコチネルTTS

最初の4週 TTS30 430(円/日)*28(日)=12040(円)

次の2週 TTS20 400(円/日)*14(日)=5600(円)

その次の2週 TTS10 380(円/日)*14(日)=5320(円)

合計 22960円

ニコレット 1個120円

1日6~12個(1日24個まで)

→1日1~2個で終了

3ヶ月間で4~5万円

2006年6月1日をもってニコチネルTTSが薬価収載されましたが、当院は現在のところ、施設基準である「構内禁煙」を満たしていないので、今後も自費となります。