

第1回 生長会 産婦人科レビュー・コース
Post-Test (110212 実施) 解答例

1. (b) Pre-Test 参照
2. (e)
3. (a) Pre-Test 参照
4. (c)
 - a × 胎盤形成後も遊走(migration)する
 - b × 高齢者・多産婦に多い(子宮内膜の損傷の影響がある)
 - c 重要な因子
 - d × 妊娠 32 週前後では、穿通・嵌入胎盤といった重度の癒着胎盤は診断可能である
 - e × 子宮体部の方が血流が豊富なため、一般的には児は小さい
5. (d) Pre-Test 参照
6. (e) Alexander JM, Bloom SL, McIntire DD, Leveno KJ. Severe preeclampsia and the very low birth weight infant: is induction of labor harmful? *Obstet Gynecol* 1999; 93: 483. Alanis MC, Robinson CJ, Hulsey TC, et al. Early-onset severe preeclampsia: Induction of labor vs elective cesarean delivery and neonatal outcomes. *Am J Obstet Gynecol* 2008;199:262.
7. a(×) b(×) c() d() e() f(×) g(×)
8. a() b(×) c(×) d(×) e() f(×) g(×)
9. a(×) b() c() d(×) e(×)
10. (b)
11. a(×) b() c() d(×) e(×) Pre-test 参照
12. a(×) b(×) c(×) d() e()
過度のアルコール、喫煙、大腿骨頸部骨折の既往歴については、骨折リスクを2倍にするので、YAM80%未満で治療を開始する。
13. (e)
14. (b)
15. a(×) b(×) c(×) d() e()
16. a() b() c() d(×) e()
17. (d)
18. (b)
19. (d)
20. a(×) b(×) c() d() e()

大変お疲れ様でした。

Pre-Test, Post Test の結果は、後日郵送いたします。