

| 薬品名              | 併用禁忌                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アストフィリン          | イノバン、エピクイック、ストメリンD、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノールS、プロタノールL、ボスミン                                                                                                                                                                                           |
| アトニン-O 5単位       | プロスタルモンE、プロスタルモンF                                                                                                                                                                                                                               |
| アベロックス錠400mg     | シベノール、クラスIA抗不整脈薬(キニジン、プロカインアミド等)、クラスIII抗不整脈薬(アミオダロン、ソタロール等)                                                                                                                                                                                     |
| アミサリン注[100mg]    | アンカロン注150                                                                                                                                                                                                                                       |
| アモキシサンカプセル25mg   | エフピー、メレリル                                                                                                                                                                                                                                       |
| アンカロン注150        | リトナビル(ノービア)、サキナビル(フォートベイス)、メシル酸サキナビル(インビラーゼ)、硫酸インジナビルエタノール付加物(クリキシバン)、メシル酸ネルフィナビル(ビラセプト)、クラスIa抗不整脈薬;プロカインアミド、キニジン等、クラスIII抗不整脈薬:ソタロール(ソタコール)、ニフェカラント(シンビット)、ベプリジル(ベプリコール)、エリスロマイシン(注射用エリスロシン)、ペンタミジン(ベナンボックス)、スパルフロキサシン(スパラ)、塩酸モキシフロキサシン(アベロックス) |
| アムビゾーム点滴静注用50mg  | 白血球輸注                                                                                                                                                                                                                                           |
| イグザレルト錠10mg      | HIVプロテアーゼ阻害剤(リトナビル(ノービア)、アタザナビル(レイアタツ)、インジナビル(クリキシバン等))、アゾール系抗真菌剤(経口又は注射剤,フルコナゾールを除く)(イトラコナゾール(イトリゾール)、ボリコナゾール(ブイフェンド)、ケトコナゾール(国内未発売)等)                                                                                                         |
| イグザレルト錠15mg      | HIVプロテアーゼ阻害剤(リトナビル(ノービア)、アタザナビル(レイアタツ)、インジナビル(クリキシバン等))、アゾール系抗真菌剤(経口又は注射剤,フルコナゾールを除く)(イトラコナゾール(イトリゾール)、ボリコナゾール(ブイフェンド)、ケトコナゾール(国内未発売)等)                                                                                                         |
| イトリゾールカプセル50     | ハルシオン、硫酸キニジン、オーラップ、ベプリコール、リポバス、カルブブロック、バイミカード、カフェルゴット、ジヒデルゴット、レビトラ                                                                                                                                                                              |
| イトリゾール内用液1%      | ハルシオン、硫酸キニジン、オーラップ、ベプリコール、リポバス、カルブブロック、バイミカード、カフェルゴット、ジヒデルゴット、レビトラ                                                                                                                                                                              |
| イトリゾール注1%[200mg] | ピモジド、キニジン、ベプリジル、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼルニジピン、ニソルジピン、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、バルデナフィル                                                                                                                                                                         |
| イノバン0.3%注シリンジ    | アストフィリン、アロテック吸入、エフェドリン注、ストメリンD、ドプス、プロタノールS、プロタノールL、ホクナリン                                                                                                                                                                                        |
| イミグラン注3          | エフピー、カフェルゴット、ジヒデルゴット、ゾーミッグ、マクサルト、メテナリン、メテルギン                                                                                                                                                                                                    |
| イムノブラダー膀胱注用      | 抗癌療法(例えば細胞傷害性薬剤療法、放射線照射)、免疫抑制量のステロイド剤、免疫抑制剤                                                                                                                                                                                                     |
| イムラン錠[50mg]      | 麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン                                                                                                                                                                                                                              |

| 薬品名                    | 併用禁忌                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リリナカン塩酸塩<br>点滴静注液      | アタザナビル硫酸塩                                                                                                  |
| リリナカン塩酸塩<br>点滴静注液      | アタザナビル硫酸塩                                                                                                  |
| インクレミンシ<br>ロップ         | タンニン酸アルブミン                                                                                                 |
| インデラル錠10<br>mg         | マクサルト、メレルル                                                                                                 |
| インデラル注射<br>液2mg        | マクサルト、メレルル、ワソラン注                                                                                           |
| イントロンA注射<br>用300       | 小柴胡湯                                                                                                       |
| イントロンA注射<br>用600       | 小柴胡湯                                                                                                       |
| イントロンA注射<br>用1000      | 小柴胡湯                                                                                                       |
| ウインタミン錠<br>12.5mg      | エピクイック、ボスミン                                                                                                |
| ウブレチド錠[5<br>mg]        | サクシン                                                                                                       |
| エースコール錠<br>2mg         | デキストラン硫酸セルロースを用いた吸着器によるアフェレー<br>シスの施行、アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜<br>(AN69(R))を用いた透析                           |
| エストラサイトカ<br>プセル        | カルシウム製剤                                                                                                    |
| エストラーナ<br>テープ0.72mg    | ヒスロンH                                                                                                      |
| エフトリン「ナガキ」<br>注射液40mg  | イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノール<br>S、プロタノールL、ボスミン                                                         |
| エフピーOD錠<br>2.5         | アナフラニール、アモキサシ、イミグラン、オピスタン、サノレック<br>ス、スルモンチール、ゾーミグ、テシプール、テトラミド、トリプ<br>タノール、トレドミン、パキシル、メジコン、ルボックス、ルジオ<br>ミール |
| エリスロシン錠<br>200mg       | ダラシン                                                                                                       |
| 塩カル注「オー<br>ツカ」20mL     | ジギトキシン、ジゴキシン(ハーフジゴキシン)、ジギラノゲンC、<br>ラニラピッド、エストラサイト                                                          |
| おたふくかぜワ<br>クチン(乾燥弱毒    | 副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオーラル等                                                                               |
| オバホルモンデ<br>ポー5mg       | ヒスロンH                                                                                                      |
| オルガドロン注<br>射液1.9mg     | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロ<br>ンH                                                                      |
| オルガドロン注<br>射液3.8mg     | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロ<br>ンH                                                                      |
| カデュエット配合<br>錠4番        | アトルバスタチン、テラプレビル、フィブラート系薬剤                                                                                  |
| カルチコール注<br>射液8.5%[5mL] | (臨)エストラサイト、ジギトキシン、ジゴキシン(ハーフジゴキシ<br>ン)、ジギラノゲンC、ラニラピッド                                                       |

| 薬品名             | 併用禁忌                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| グラケールカプセル15mg   | ワーファリン                                                                   |
| クラシエ小柴胡湯エキス細粒   | INF $\alpha$ 、INF $\beta$ 、アドバフェロン、イントロンA、キャンフェロン、スミフェロン、フェロン、ペガシス       |
| クレストール錠2.5mg    | サンディミュン、ネオール                                                             |
| クレストール錠5mg      | サンディミュン、ネオール                                                             |
| コートリル錠[10mg]    | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                        |
| コートン錠25mg       | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                        |
| コバシル錠4mg        | デキストラン硫酸セルロースを用いた吸着器によるアフェレーシスの施行、アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜(AN69(R))を用いた透析 |
| コントミン注[25mg]    | エピクイック、ボスミン                                                              |
| サイモグロブリン点滴静注用   | 弱毒生ワクチン                                                                  |
| サインバルタカプセル20mg  | セレギリン塩酸塩                                                                 |
| シアナマイド液「Wf」     | ジギラノゲンC、薬用酒等                                                             |
| ジェムザール注射用200mg  | 胸部放射線照射                                                                  |
| ジェムザール注射用1g     | 胸部放射線照射                                                                  |
| ジギラノゲンC注射液2mL   | カルチコール、塩カル注、メディジェクトCa、サクシン、(臨)シアナマイド液                                    |
| ジヒデルゴット[1mg]    | イミグラン、ゾーミグ                                                               |
| ジフルカンカプセル100mg  | ハルシオン                                                                    |
| ジプロフロキサシンDU点滴静注 | ケトプロフェン、テルネリン                                                            |
| シベノール錠50mg      | レビトラ、アベロックス、フェアストン                                                       |
| シベノール注射液70mg    | レビトラ、アベロックス、フェアストン                                                       |
| シュアポスト錠0.5mg    | シルデナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル                                        |
| シンビット静注用50mg    | アンカロン注150                                                                |
| 水溶性プレドニン10mg    | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                        |
| 水溶性プレドニン20mg    | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                        |
| 水溶性プレドニン50mg    | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                        |

| 薬品名                       | 併用禁忌                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| スミフェロン300                 | 小柴胡湯                                         |
| スミフェロン600                 | 小柴胡湯                                         |
| 精製ツベルクリン一般診断用             | 副腎皮質ホルモン剤                                    |
| セララ錠50mg                  | カリウム製剤、カリウム保持性利尿薬                            |
| セlestamin錠                | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH            |
| セレネース錠0.75mg              | エピクイック、ボスミン                                  |
| セレネース錠1.5mg               | エピクイック、ボスミン                                  |
| セレネース細粒1%                 | エピクイック、ボスミン                                  |
| セレネース液(2mg/ml)            | エピクイック、ボスミン                                  |
| セレネース注射液[5mg]             | エピクイック、ボスミン                                  |
| ゼローダ錠300                  | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(ティーエスワン)             |
| ゾーミッグRM錠2.5mg             | イミグラン、エプピー、カフェルゴット、ジヒデルゴット、マクサルト、メテナリン、メテルギン |
| ソルコーテフ100                 | ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH                          |
| ソルコーテフ500                 | ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH                          |
| ソルメドロール40                 | ワクチン 精製ツベルクリン、ヒスロンH                          |
| ソルメドロール125                | ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH                          |
| ソルメドロール500                | ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH                          |
| ソルメドロール1000               | ワクチン、精製ツベルクリン、ヒスロンH                          |
| ダイアート錠[30mg]              | ノルアドレナリン                                     |
| タココンブ(4.8cm x4.8cm)       | トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン                          |
| タココンブ(9.5cm x4.8cm)レギュラーサ | トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン                          |
| ダラシンカプセル150mg             | エリスロマイシン                                     |
| ダラシンS注600mg               | エリスロシン                                       |
| チガソンカプセル10                | ビタミンA                                        |
| ティーエスワンカプセル20             | 5-FU、ユーエフティ、フルツロン、アイソボリン                     |

| 薬品名                | 併用禁忌                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ティーエスワンカプセル25      | 5-FU、ユーエフティ、フルツロン、アイソボリン                                   |
| ティーエスワン配合顆粒T20     | 5-FU、ユーエフティ、フルツロン、アイソボリン                                   |
| ティーエスワン配合顆粒T25     | 5-FU、ユーエフティ、フルツロン、アイソボリン                                   |
| デカドロン錠             | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                          |
| テシプール錠[1mg]        | エフピー                                                       |
| テトラミド錠10mg         | エフピー                                                       |
| デパケン細粒40%          | カルベニン、メロペン                                                 |
| デパケンシロップ5%         | カルベニン                                                      |
| デパケンR錠100          | カルベニン、メロペン                                                 |
| デパケンR錠200          | カルベニン、メロペン                                                 |
| デュファストン[5mg]       | ヒスロンH                                                      |
| テルネリン錠1mg          | シプロキササン                                                    |
| ドプスカプセル100         | イノバン、エピクイック、セボフレノ、ドミニン、ノルアドレナリン、フォーレン、プロタノールS、プロタノールL、ボスミン |
| ドラール錠15            | 食物                                                         |
| ドラール錠20            | 食物                                                         |
| トランサミン錠[250mg]     | トロンビン、ボルヒール、タココンブ                                          |
| トランサミン注5%[250mg]   | トロンビン、ボルヒール、タココンブ                                          |
| トランサミン注10%[1000mg] | トロンビン、ボルヒール、タココンブ                                          |
| トリプタノール錠10mg       | エフピー                                                       |
| トリプタノール錠25mg       | エフピー                                                       |
| トレドミン錠15           | エフピー                                                       |
| トレドミン錠25           | エフピー                                                       |
| トロンビン細粒[経口](5千u/包) | レプチラーゼ、トランサミン、ボルヒール、タココンブ                                  |
| トロンビン液ソフトボトル5千単位   | レプチラーゼ、トランサミン、ボルヒール、タココンブ                                  |
| トロンビン液ソフトボトル1万単位   | レプチラーゼ、トランサミン、ボルヒール、タココンブ                                  |

| 薬品名                | 併用禁忌                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ネオーラルカプセル10mg      | 生ワクチン                                                                           |
| ネオーラルカプセル25mg      | 生ワクチン                                                                           |
| ネオーラルカプセル50mg      | 生ワクチン                                                                           |
| ノアルテンD錠            | ヒスロンH                                                                           |
| ノバミン錠5mg           | エピクイック、ボスミン                                                                     |
| パキシル錠10mg          | エフピー、メレリル                                                                       |
| パキシル錠20mg          | エフピー、メレリル                                                                       |
| パクリタキセル注30mg/5mL   | ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩                                                  |
| パクリタキセル注           | ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩                                                  |
| パーセリン錠25           | ヒスロンH                                                                           |
| ハーフジゴキシンKY錠0.125mg | カルチコール、塩カル注、メディジェクトCa、サクシン                                                      |
| BCGワクチン(乾燥)        | 副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオーラル等                                                    |
| ヒスロンH200           | 黄体ホルモン、卵胞ホルモン、副腎皮質ホルモン                                                          |
| ヒルナミン錠5mg          | エピクイック、ボスミン                                                                     |
| ヒルナミン錠25mg         | エピクイック、ボスミン                                                                     |
| 5-FU協和[250mg]      | TS-1及びTS-1中止後7日内の投与                                                             |
| 5-FU注1000mg        | TS-1及びTS-1中止後7日内の投与                                                             |
| ファンギゾン[50mg]       | 白血球輸注中又は直後に本剤を投与                                                                |
| バイフェンド錠50mg        | リファジン、ミコブティン、ストックリン、ノービア、カレトラ、テグレトール、バルビタール、フェノバルビタール、オーラップ、硫酸キニジン、エルゴタミン、ハルシオン |
| バイフェンド錠200mg       | リファジン、ミコブティン、ストックリン、ノービア、カレトラ、テグレトール、バルビタール、フェノバルビタール、オーラップ、硫酸キニジン、エルゴタミン、ハルシオン |
| 風しんワクチン(乾燥弱毒生)     | 副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオーラル等                                                    |
| フェルムカプセル           | タンニン酸アルブミン                                                                      |
| フェロミア錠50mg         | タンニン酸アルブミン                                                                      |
| フェロン300            | 小柴胡湯                                                                            |

| 薬品名                   | 併用禁忌                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| フェロン600               | 小柴胡湯                                                                      |
| プリモジアンデポー             | ヒスロンH                                                                     |
| ブレオ注射用5mg             | 胸部及びその周辺部への放射線照射                                                          |
| ブレオ注射用15mg            | 胸部及びその周辺部への放射線照射                                                          |
| プレドニン錠5mg             | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                         |
| プレドニゾロン錠1mg(旭化成)      | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                         |
| プレマリン錠0.625mg         | ヒスロンH                                                                     |
| プロイメンド点滴静注用150mg      | オーラップ錠1mg、3mg、細粒1%                                                        |
| プロゲデポー125mg           | ヒスロンH                                                                     |
| プロジフ静注液100            | ハルシオン                                                                     |
| プロジフ静注液200            | ハルシオン                                                                     |
| プロジフ静注液400            | ハルシオン                                                                     |
| プロスタール錠25             | ヒスロンH                                                                     |
| プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 | アトニン-O、プロスタルモンF                                                           |
| プロスタルモン・F注射液1000      | アトニン-O、プロスタルモンE                                                           |
| プロタノールS錠[15mg]        | アストフィリン、アロテック、イノバン、エピクイック、エフェドリン、ストメリン、ドプス、ドミニン、ノルアドレナリン、ベロテック、ボスミン、ホクナリン |
| プロタノールL注[0.2mg]       | イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、ホクナリン、ボスミン                                      |
| プロベラ[2.5mg]           | ヒスロンH                                                                     |
| ペガシス皮下注90 $\mu$ g     | 小柴胡湯                                                                      |
| ペグイントロン50 $\mu$ g     | 小柴胡湯                                                                      |
| ペグイントロン100 $\mu$ g    | 小柴胡湯                                                                      |
| ペグイントロン150 $\mu$ g    | 小柴胡湯                                                                      |
| ベゲタミンA錠               | エピクイック、ボスミン                                                               |
| ベゲタミンB錠               | エピクイック、ボスミン                                                               |
| ベザトールSR錠[200mg]       | (原則禁忌)メバロチン、リピトール                                                         |

| 薬品名                 | 併用禁忌                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ベサノイドカプセル[10mg]     | ビタミンA                                                                                                                        |
| ホクナリンテープ0.5mg       | イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノールS、プロタノールL、ボスミン                                                                               |
| ホクナリンテープ2mg         | イノバン、エピクイック、ドミニン、ノルアドレナリン、プロタノールS、プロタノールL、ボスミン                                                                               |
| ボスミン注[1mg]          | インプロメン、ウインタミン、カルデナリン、クロフェクトン、コントミン、ジブプレキサ、セボフレン、セレネース、セロクエル、ノバミン、ヒルナミン、フォーレン、プロタノールS、プロタノールL、ヘゲタミンA、ヘゲタミンB、ホクナリン、メレリル、リスパダール |
| ボスミン液0.1%           | インプロメン、ウインタミン、カルデナリン、クロフェクトン、コントミン、ジブプレキサ、セボフレン、セレネース、セロクエル、ノバミン、ヒルナミン、フォーレン、プロタノールS、プロタノールL、ヘゲタミンA、ヘゲタミンB、ホクナリン、メレリル、リスパダール |
| ホーリン錠1mg            | ヒスロンH                                                                                                                        |
| ホーリンV腔用錠1mg         | ヒスロンH                                                                                                                        |
| ボルヒール1mL            | トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン                                                                                                          |
| ボルヒール3mL            | トランサミン、レプチラーゼ、トロンビン                                                                                                          |
| マイリス腔坐剤[600mg]      | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH                                                                                            |
| マクスルトRPD錠10mg       | イミグラン、インデラル、エフピー、カフェルゴット、ジヒデルゴット、ゾーミック、メテナリン、メテルギン                                                                           |
| 麻しんワクチン(乾燥弱毒生)      | 副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤、イムラン、ネオオーラル等                                                                                                |
| メジコン錠15mg           | エフピー                                                                                                                         |
| メジコン散(100mg/g)      | エフピー                                                                                                                         |
| メジコンシロップ            | エフピー                                                                                                                         |
| メチルエルゴメトリン注0.2mg「あ」 | イミグラン、ゾーミック                                                                                                                  |
| メテルギン錠[0.125mg]     | イミグラン、ゾーミック                                                                                                                  |
| メドロール錠[4mg]         | ワクチン 精製ツベルクリン、ヒスロンH                                                                                                          |
| メバロチン錠5             | (原則禁忌)ベザトールSR                                                                                                                |
| メバロチン錠10            | (原則禁忌)ベザトールSR                                                                                                                |
| メロペン点滴用0.5g         | デパケン                                                                                                                         |
| ユーエフティ              | TS-1及びTS-1中止後7日内の投与                                                                                                          |
| ユーエフティーE腸溶顆粒 100    | TS-1及びTS-1中止後7日内の投与                                                                                                          |
| ユーエフティーE腸溶顆粒 200    | TS-1及びTS-1中止後7日内の投与                                                                                                          |



| 薬品名                     | 併用禁忌                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| ラニラピッド錠<br>0.1mg        | サクシン、塩カル注、メディジェクトCa、カルチコール                  |
| リスパダール錠<br>1mg          | エピクイック、ボスミン                                 |
| リドーラ錠[3mg]              | (臨)メタルカプターゼ200                              |
| リメタゾン静注<br>2.5mg        | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| 硫酸キニジン錠<br>100mg        | イトリゾール、フロリード、メレリル、アンカロン注150、ボリコナゾール(ブイフェンド) |
| リンデロン錠<br>[0.5mg]       | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロン散<br>(1mg/g)       | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロンシロップ<br>(0.1mg/mL) | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロン注2mg               | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロン注4mg               | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロン注20mg              | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロン懸濁注<br>[2.5mg]     | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロン坐剤<br>0.5mg        | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| リンデロン坐剤<br>1mg          | 精製ツベルクリン、麻疹、風疹、おたふく、BCGワクチン、ヒスロンH           |
| ルジオミール錠<br>10mg         | エフピー                                        |
| ルジオミール錠<br>25mg         | エフピー                                        |
| ルボックス錠25                | エフピー、メレリル                                   |
| ルボックス錠50                | エフピー、メレリル                                   |
| レプチラーゼS<br>注[2mL]       | トロンビン、ボルヒール、タココンブ                           |
| レボホリナート<br>25mg 注「NP」   | TS-1及びTS-1中止後7日内の投与                         |
| ロイコボリン錠<br>25mg(ユーゼル)   | TS-1及びTS-1中止後7日内の投与                         |
| ワゴスチグミン<br>散0.5%        | サクシン                                        |
| ワソラン注[5mg]              | インデラル注                                      |
| ワーファリン錠1mg              | グラケー                                        |