



**mFOLFOX6**

催吐リスク: 3

適応疾患: 切除不能・再発胃がん

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名              | 推奨投与量                  | 投与日 |
|------------------|------------------------|-----|
| オキサリプラチン         | 85 mg/m <sup>2</sup>   | d1  |
| フルオロウラシル(45時間持続) | 2400 mg/m <sup>2</sup> | d1~ |
| フルオロウラシル(bolus)  | 400 mg/m <sup>2</sup>  | d1  |
| レボホリナート          | 200 mg/m <sup>2</sup>  | d1  |

**mFOLFOX6+ニボルマブ**

催吐リスク: 3

適応疾患: HER2陰性の化学未治療の切除不能な進行又は再発胃癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名              | 推奨投与量                  | 投与日 |
|------------------|------------------------|-----|
| オキサリプラチン         | 85 mg/m <sup>2</sup>   | d1  |
| オブジーボ            | 240 mg/body            | d1  |
| フルオロウラシル(45時間持続) | 2400 mg/m <sup>2</sup> | d1~ |
| フルオロウラシル(bolus)  | 400 mg/m <sup>2</sup>  | d1  |
| レボホリナート          | 200 mg/m <sup>2</sup>  | d1  |

**SOX**

催吐リスク: 3

適応疾患: 胃がん(切除不能・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                 | 投与日        |
|-------------|-----------------------|------------|
| オキサリプラチン    | 130 mg/m <sup>2</sup> | d1         |
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup>  | d1~14→1週休薬 |

**SOX+トラスツズマブ**

催吐リスク: 3

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                 | 投与日        |
|----------------|-----------------------|------------|
| オキサリプラチン       | 130 mg/m <sup>2</sup> | d1         |
| ティーエスワン(内服)    | 80 mg/m <sup>2</sup>  | d1~14→1週休薬 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg               | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg               | d1         |

**SOX+ニボルマブ**

催吐リスク: 3

適応疾患: HER2陰性の化学未治療の切除不能な進行又は再発胃癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                 | 投与日        |
|-------------|-----------------------|------------|
| オキサリプラチン    | 130 mg/m <sup>2</sup> | d1         |
| オブジーボ       | 360 mg/body           | d1         |
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup>  | d1~14→1週休薬 |

## weekly アルブミン懸濁型パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                 | 投与日     |
|--------|-----------------------|---------|
| アブラキサン | 100 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15 |

## XELOX

催吐リスク: 3

適応疾患: 胃がん(切除不能・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名      | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------|------------------------|------------|
| オキサリプラチン | 130 mg/m <sup>2</sup>  | d1         |
| ゼローダ(内服) | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |

## XELOX+トラスツズマブ

催吐リスク: 3

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------------|------------------------|------------|
| オキサリプラチン       | 130 mg/m <sup>2</sup>  | d1         |
| ゼローダ(内服)       | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg                | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg                | d1         |

## XELOX+ニボルマブ

催吐リスク: 3

適応疾患: HER2陰性の化学未治療の切除不能な進行又は再発胃癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名      | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------|------------------------|------------|
| オキサリプラチン | 130 mg/m <sup>2</sup>  | d1         |
| オブジーボ    | 360 mg/body            | d1         |
| ゼローダ(内服) | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |

## アルブミン懸濁型パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                 | 投与日 |
|--------|-----------------------|-----|
| アブラキサン | 260 mg/m <sup>2</sup> | d1  |

## イリノテカン(2週1コース)

催吐リスク: 3

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                 | 投与日 |
|--------|-----------------------|-----|
| イリノテカン | 150 mg/m <sup>2</sup> | d1  |

## イリノテカン(5週1コース)

催吐リスク: 3

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 5週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                 | 投与日     |
|--------|-----------------------|---------|
| イリノテカン | 100 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15 |

## イリノテカン+biweekly シスプラチン+トラスツズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: 切除不能胃がん(HER2陽性)

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日      |
|----------------|----------------------|----------|
| イリノテカン         | 60 mg/m <sup>2</sup> | d1、15、29 |
| シスプラチン         | 30 mg/m <sup>2</sup> | d1、15、29 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d22      |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d1       |

## イリノテカン+シスプラチン(2週1コース)

催吐リスク: 4

適応疾患: 切除不能胃がん

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                | 投与日 |
|--------|----------------------|-----|
| イリノテカン | 60 mg/m <sup>2</sup> | d1  |
| シスプラチン | 30 mg/m <sup>2</sup> | d1  |

## イリノテカン+シスプラチン(4週1コース)

催吐リスク: 4

適応疾患: 切除不能胃がん

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                | 投与日   |
|--------|----------------------|-------|
| イリノテカン | 70 mg/m <sup>2</sup> | d1、15 |
| シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1    |

## イリノテカン+シスプラチン+トラスツズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: 切除不能胃がん(HER2陽性)

投与スケジュール: 12週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日               |
|----------------|----------------------|-------------------|
| イリノテカン         | 70 mg/m <sup>2</sup> | d1、15、29、43、57、71 |
| シスプラチン         | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1、29、57          |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d22、43、64         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d1                |

## イリノテカン+トラスツズマブ

催吐リスク: 3

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名               | 推奨投与量                 | 投与日             |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| イリノテカン            | 150 mg/m <sup>2</sup> | d1、15、29(2週に1回) |
| トラスツズマブ(Day1)     | 8 mg/kg               | 初回              |
| トラスツズマブ(Day22,43) | 6 mg/kg               | d1、22(3週に1回)    |

## オブジーボ

催吐リスク: 1

適応疾患: 胃癌(進行・再発)

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名   | 推奨投与量       | 投与日 |
|-------|-------------|-----|
| オブジーボ | 240 mg/body | d1  |

## カペシタビン+シスプラチン

催吐リスク: 4

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名      | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------|------------------------|------------|
| シスプラチン   | 80 mg/m <sup>2</sup>   | d1         |
| ゼローダ(内服) | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |

## カペシタビン+シスプラチン[ショートハイドレーション]

催吐リスク: 4

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名      | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------|------------------------|------------|
| シスプラチン   | 80 mg/m <sup>2</sup>   | d1         |
| ゼローダ(内服) | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |

## カペシタビン+シスプラチン+トラスツズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------------|------------------------|------------|
| シスプラチン         | 80 mg/m <sup>2</sup>   | d1         |
| ゼローダ(内服)       | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg                | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg                | d1         |

## カペシタビン+シスプラチン+トラスツズマブ[ショートハイドレーション]

催吐リスク: 4

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------------|------------------------|------------|
| シスプラチン         | 80 mg/m <sup>2</sup>   | d1         |
| ゼローダ(内服)       | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg                | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg                | d1         |

## カペシタビン+トラスツズマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                  | 投与日        |
|----------------|------------------------|------------|
| ゼローダ(内服)       | 2000 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg                | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg                | d1         |

## サイラムザ+アルブミン懸濁型パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 進行・再発胃癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                 | 投与日     |
|--------|-----------------------|---------|
| アブラキサン | 100 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15 |
| サイラムザ  | 8 mg/kg               | d1、15   |

## サイラムザ+アルブミン懸濁型パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 進行・再発胃癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                 | 投与日     |
|--------|-----------------------|---------|
| アブラキサン | 100 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15 |
| サイラムザ  | 8 mg/kg               | d1、15   |

## サイラムザ+パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 進行・再発胃癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名     | 推奨投与量                | 投与日     |
|---------|----------------------|---------|
| サイラムザ   | 8 mg/kg              | d1、15   |
| パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15 |

## ティーエスワン+イリノテカン

催吐リスク: 3

適応疾患: 進行・再発胃がん

投与スケジュール: 5週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                | 投与日        |
|-------------|----------------------|------------|
| イリノテカン      | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1、15      |
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~21→2週休薬 |

## ティーエスワン+シスプラチン

催吐リスク: 4

適応疾患: 胃がん

投与スケジュール: 5週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                | 投与日        |
|-------------|----------------------|------------|
| シスプラチン      | 60 mg/m <sup>2</sup> | d8         |
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~21→2週休薬 |

## ティーエスワン+シスプラチン[ショートハイドレーション]

催吐リスク: 4

適応疾患: 胃がん

投与スケジュール: 5週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                | 投与日        |
|-------------|----------------------|------------|
| シスプラチン      | 60 mg/m <sup>2</sup> | d8         |
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~21→2週休薬 |

## ティーエスワン+シスプラチン+トラスツズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日        |
|----------------|----------------------|------------|
| シスプラチン         | 60 mg/m <sup>2</sup> | d1         |
| ティーエスワン(内服)    | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d1         |

## ティーエスワン+ドセタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 進行・再発胃がん

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                | 投与日        |
|-------------|----------------------|------------|
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| ドセタキセル      | 40 mg/m <sup>2</sup> | d1         |

## ティーエスワン+ドセタキセル+シスプラチン

催吐リスク: 4

適応疾患: 進行・再発胃がん

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                | 投与日        |
|-------------|----------------------|------------|
| シスプラチン      | 60 mg/m <sup>2</sup> | d8         |
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| ドセタキセル      | 60 mg/m <sup>2</sup> | d8         |

## ティーエスワン+ドセタキセル+シスプラチン+トラスツズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日        |
|----------------|----------------------|------------|
| シスプラチン         | 60 mg/m <sup>2</sup> | d8         |
| ティーエスワン(内服)    | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| ドセタキセル         | 60 mg/m <sup>2</sup> | d8         |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d8         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d8         |

## ティーエスワン+ドセタキセル+トラスツズマブ

催吐リスク: 2

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日        |
|----------------|----------------------|------------|
| ティーエスワン(内服)    | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| ドセタキセル         | 40 mg/m <sup>2</sup> | d1         |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d1         |

## ティーエスワン+トラスツズマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日        |
|----------------|----------------------|------------|
| ティーエスワン(内服)    | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→1週休薬 |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d1         |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d1         |

## ティーエスワン+パクリタキセル(4週1コース)

催吐リスク: 2

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                | 投与日        |
|-------------|----------------------|------------|
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~14→2週休薬 |
| パクリタキセル     | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1、15      |

## ティーエスワン+パクリタキセル(5週1コース)

催吐リスク: 2

適応疾患: 胃がん、肝転移(腹膜播種)

投与スケジュール: 5週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名         | 推奨投与量                | 投与日        |
|-------------|----------------------|------------|
| ティーエスワン(内服) | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1~21→2週休薬 |
| パクリタキセル     | 50 mg/m <sup>2</sup> | d1、8       |

## ドセタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 再発・進行胃がん

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量                | 投与日 |
|--------|----------------------|-----|
| ドセタキセル | 60 mg/m <sup>2</sup> | d1  |

## ドセタキセル+トラスツズマブ

催吐リスク: 2

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日 |
|----------------|----------------------|-----|
| ドセタキセル         | 60 mg/m <sup>2</sup> | d1  |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d1  |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d1  |

## ドセタキセル+トラスツズマブ

催吐リスク: 2

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                | 投与日 |
|----------------|----------------------|-----|
| ドセタキセル         | 60 mg/m <sup>2</sup> | d1  |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg              | d1  |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg              | d1  |

## ニボルマブ(4週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 胃癌(進行・再発)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名   | 推奨投与量       | 投与日 |
|-------|-------------|-----|
| オプジーボ | 480 mg/body | d1  |

## パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名     | 推奨投与量                | 投与日     |
|---------|----------------------|---------|
| パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15 |

## パクリタキセル+トラスツズマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 12週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名               | 推奨投与量                | 投与日         |
|-------------------|----------------------|-------------|
| トラスツズマブ(Day1)     | 8 mg/kg              | d1          |
| トラスツズマブ(Day22,43) | 6 mg/kg              | 初回以降3週間隔    |
| パクリタキセル           | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15を4週毎 |

## パクリタキセル+トラスツズマブ

催吐リスク: 2

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 12週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名               | 推奨投与量                | 投与日         |
|-------------------|----------------------|-------------|
| トラスツズマブ(Day1)     | 8 mg/kg              | d1          |
| トラスツズマブ(Day22,43) | 6 mg/kg              | 初回以降3週間隔    |
| パクリタキセル           | 80 mg/m <sup>2</sup> | d1、8、15を4週毎 |

## フルオロウラシル+シスプラチン+トラスツズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: HER2過剰発現が確認された胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名            | 推奨投与量                 | 投与日  |
|----------------|-----------------------|------|
| シスプラチン         | 80 mg/m <sup>2</sup>  | d1   |
| トラスツズマブ(2回目以降) | 6 mg/kg               | d1   |
| トラスツズマブ(初回)    | 8 mg/kg               | d1   |
| フルオロウラシル       | 800 mg/m <sup>2</sup> | d1~5 |

## フルオロウラシル+メトレキサート+ホリナート

催吐リスク: 2

適応疾患: 胃がん(進行・再発)

投与スケジュール: 2~3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名        | 推奨投与量                 | 投与日 |
|------------|-----------------------|-----|
| フルオロウラシル   | 600 mg/m <sup>2</sup> | d1  |
| メトレキサート    | 100 mg/m <sup>2</sup> | d1  |
| ロイコボリン(内服) | (5mg)2錠×6回(6時間ごと)     | d1  |



## フルオロウラシル5日間持続療法

催吐リスク: 2

適応疾患: 胃がん(切除不能又は再発)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名      | 推奨投与量                 | 投与日  |
|----------|-----------------------|------|
| フルオロウラシル | 800 mg/m <sup>2</sup> | d1~5 |

## ラムシルマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: 進行・再発胃癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名   | 推奨投与量   | 投与日 |
|-------|---------|-----|
| サイラムザ | 8 mg/kg | d1  |

### 推奨投与量の単位

mg/m<sup>2</sup>:【体表面積】あたりの量      mg/kg:【体重】あたりの量  
AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

### 略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん  
SCLC: 小細胞肺がん  
PD: 病勢進行