



頭頸部

weekly カルボプラチン+UFT+放射線治療

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 1週1コース (6~8コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	1.25 AUC	d1
ユーエフティ	300 mg/body	d1~7

weekly カルボプラチン+放射線治療

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部癌

投与スケジュール: 1週1コース (7コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	1.5 AUC	d1

weekly シスプラチン+放射線治療

催吐リスク: 4

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 1週1コース(7コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	40 mg/m ²	d1

カルボプラチン+5-FU(ポンプ使用)

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5 AUC	d1
フルオロウラシル	1600 mg/m ²	d1、3

カルボプラチン+フルオロウラシル

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5 AUC	d1
フルオロウラシル	800 mg/m ²	d1~4

カルボプラチン+放射線治療

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 1週1コース (3コース以上)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	100 mg/body	d1

シスプラチン(80)+フルオロウラシル(800)

催吐リスク: 4

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 3～4週1コース (最大6コース)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	80 mg/m ²	d1
フルオロウラシル	800 mg/m ²	d1～5

シスプラチン+フルオロウラシル+ペムブロリズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	200 mg	d1
シスプラチン	100 mg/m ²	d1
フルオロウラシル	1000 mg/m ²	d1～4

シスプラチン+放射線治療

催吐リスク: 4

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 7週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	100 mg/m ²	d1、22、43

セツキシマブ biweekly

催吐リスク: 1

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス	500 mg/m ²	d1

セツキシマブ(セツキシマブ併用レジメン使用後)

催吐リスク: 1

適応疾患: 頭頸部がん《Cmab併用レジメン使用後》

投与スケジュール: 1週1コース (PDまで)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス	250 mg/m ²	d1

セツキシマブ+カルボプラチン+5-FU

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス(2回目以降)	250 mg/m ²	d8、15
アービタックス(初回)	400 mg/m ²	d1
カルボプラチン	5 AUC	d1
フルオロウラシル	800 mg/m ²	d1～4

セツキシマブ+カルボプラチン+5-FU(ホップ使用)

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス(2回目以降)	250 mg/m ²	d8、15
アービタックス(初回)	400 mg/m ²	d1
カルボプラチン	5 AUC	d1
フルオロウラシル	1600 mg/m ²	d1、3

セツキシマブ+シスプラチン+5-FU

催吐リスク: 4

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3～4週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス(2回目以降)	250 mg/m ²	d1、d8、15、(22)
アービタックス(2回目以降)	250 mg/m ²	d8、15、(22)
アービタックス(初回)	400 mg/m ²	d1
シスプラチン	80 mg/m ²	d1
フルオロウラシル	800 mg/m ²	d1～5

セツキシマブ+パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 1週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス(2回目以降)	250 mg/m ²	d1
アービタックス(初回)	400 mg/m ²	d1
パクリタキセル	80 mg/m ²	d1

セツキシマブ+放射線治療

催吐リスク: 1

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 1週1コース (7コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス(2回目以降)	250 mg/m ²	d1
アービタックス(初回)	400 mg/m ²	d1

ドセタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 3～4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ドセタキセル	60 mg/m ²	d1

ドセタキセル+シスプラチン

催吐リスク: 4

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 3週1コース（6コース予定）

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	75 mg/m ²	d1
ドセタキセル	75 mg/m ²	d1

ドセタキセル+シスプラチン+フルオロウラシル

催吐リスク: 4

適応疾患: 頭頸部がん

投与スケジュール: 3週1コース（4コース予定）

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	75 mg/m ²	d1
ドセタキセル	75 mg/m ²	d1
フルオロウラシル	750 mg/m ²	d1～5

トラスツマブ+ドセタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ドセタキセル	70 mg/m ²	d1
トラスツマブ（2回目以降）	6 mg/kg	d1
トラスツマブ（初回）	8 mg/kg	d1

ニボルマブ（2週1コース）

催吐リスク: 1

適応疾患: 再発または遠隔転移を有する頭頸部癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オプジーボ	240 mg/body	d1

ニボルマブ（4週1コース）

催吐リスク: 1

適応疾患: 再発または遠隔転移を有する頭頸部癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オプジーボ	480 mg/body	d1

パクリタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 再発・転移頭頸部癌

投与スケジュール: 8週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
パクリタキセル	100 mg/m ²	d1、8、15、22、29、36

パクリタキセル+カルボプラチン

催吐リスク: 3

適応疾患: 再発転移頭頸部癌(シスプラチン不適の頭頸部扁平上皮癌、頭頸部非扁平上皮癌)

投与スケジュール: 3週1コース (6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	6 AUC	d1
パクリタキセル	175 mg/m ²	d1

パクリタキセル+カルボプラチン+セツキシマブ

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アービタックス(2回目以降)	250 mg/m ²	d1、8、15
アービタックス(初回)	400 mg/m ²	d1
カルボプラチン	2.5 AUC	d1、8
パクリタキセル	100 mg/m ²	d1、8

ペムブロリズマブ(3週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	200 mg	d1

ペムブロリズマブ(6週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 6週1コース(PDまで)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	400 mg	d1

ペムブロリズマブ+カルボプラチン+5-FU

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5 AUC	d1
キイトルーダ	200 mg	d1
フルオロウラシル	1000 mg/m ²	d1～4

ペムブロリズマブ+カルボプラチン+5-FU(ホップ®使用)

催吐リスク: 3

適応疾患: 頭頸部がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5 AUC	d1
キイトルーダ	200 mg	d1
フルオロウラシル	2000 mg/m ²	d1、3

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量

mg/kg:【体重】あたりの量

AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC:非小細胞肺癌

SCLC:小細胞肺癌

PD:病勢進行