



中皮腫

オブジーボ(2週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	240 mg/body	d1

カルボプラチン+ペトレキセド

催吐リスク: 3

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4~6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5 AUC	d1
ペトレキセド	500 mg/m ²	d1

カルボプラチン+ペトレキセド+ペムブロリズマブ

催吐リスク: 3

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4~6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	5~6 AUC	d1
キイトルーダ	200 mg	d1
ペトレキセド	500 mg/m ²	d1

シスプラチン+ペトレキセド(呼吸器)

催吐リスク: 4

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	75 mg/m ²	d1
ペトレキセド	500 mg/m ²	d1

シスプラチン+ペトレキセド(呼吸器) [SHVer.]

催吐リスク: 4

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
シスプラチン	75 mg/m ²	d1
ペトレキセド	500 mg/m ²	d1

シスプラチン+ペトレキセド+ペムブロリズマブ

催吐リスク: 4

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース (4~6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	200 mg	d1
シスプラチン	75 mg/m ²	d1
ペトレキセド	500 mg/m ²	d1

ニボルマブ(2週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性中皮腫

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	240 mg/body	d1

ニボルマブ(2週毎)+イピリムマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	240 mg/body	d1、15、29
ヤーボイ	1 mg/kg	d1

ニボルマブ(3週毎)+イピリムマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	360 mg/body	d1、22
ヤーボイ	1 mg/kg	d1

ニボルマブ(4週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性中皮腫

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	480 mg/body	d1

ニボルマブ(4週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	480 mg/body	d1

ペムブロリズマブ《ペムブロリズマブ併用レジメン使用後》

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性胸膜中皮腫

投与スケジュール: 3週1コース（前治療含め35コース予定）

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	200 mg	d1

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
AUC:カルバートの式により算出 ⇒ 投与量(mg/body)=AUC目標値 × (GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん
SCLC: 小細胞肺がん
PD: 病勢進行