



アキシチニブ+アベルマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能または転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
インライタ	10 mg	d1～14
バベンチオ	10 mg/kg	d1

アキシチニブ+ペムブロリズマブ(3週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能または転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
インライタ	4～20 mg	d1～21
キイトルーダ	200 mg	d1

アキシチニブ+ペムブロリズマブ(6週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能または転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
インライタ	4～20 mg	d1～42
キイトルーダ	400 mg	d1

オブジーボ+ヤーボイ

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 3週1コース(4コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	240 mg/body	d1
ヤーボイ	1 mg/kg	d1

カボザンチニブ+ニボルマブ(2週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	240 mg/body	d1
カボメティクス	40 mg/body	d1-14

カボメティクス+ニボルマブ(4週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	480 mg/body	d1
カボメティクス	40 mg/body	d1-28

ニボルマブ(2週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	240 mg/body	d1

ニボルマブ(4週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
オブジーボ	480 mg/body	d1

ペムブロリズマブ(3週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 局所進行性腎細胞癌

投与スケジュール: 3週1コース(12ヶ月予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	200 mg	d1

ペムブロリズマブ(6週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 局所進行性腎細胞癌

投与スケジュール: 6週1コース(12ヶ月予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	400 mg	d1

レンバチニブ+ペムブロリズマブ(3週1コース)

催吐リスク: 3

適応疾患: 進行・再発の腎細胞癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	200 mg	d1
レンビマ	20 mg	d1～21

レンバチニブ+ペムブロリズマブ(6週1コース)

催吐リスク: 3

適応疾患: 進行・再発の腎細胞癌

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
キイトルーダ	400 mg	d1
レンビマ	20 mg	d1～42

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん
SCLC: 小細胞肺がん
PD: 病勢進行