

## アキシチニブ+アベルマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能または転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名   | 推奨投与量    | 投与日   |
|-------|----------|-------|
| インライタ | 10 mg    | d1~14 |
| バベンチオ | 10 mg/kg | d1    |

## アキシチニブ+ペムブロリズマブ(3週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能または転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量   | 投与日   |
|--------|---------|-------|
| インライタ  | 4~20 mg | d1~21 |
| キイトルーダ | 200 mg  | d1    |

## アキシチニブ+ペムブロリズマブ(6週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 切除不能または転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量   | 投与日   |
|--------|---------|-------|
| インライタ  | 4~20 mg | d1~42 |
| キイトルーダ | 400 mg  | d1    |

## オブジーボ+ヤーボイ

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 3週1コース(4コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名   | 推奨投与量       | 投与日 |
|-------|-------------|-----|
| オブジーボ | 240 mg/body | d1  |
| ヤーボイ  | 1 mg/kg     | d1  |

## カボザンチニブ+ニボルマブ(2週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名     | 推奨投与量       | 投与日   |
|---------|-------------|-------|
| オブジーボ   | 240 mg/body | d1    |
| カボメティクス | 40 mg/body  | d1-14 |

## カボメティクス+ニボルマブ(4週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名     | 推奨投与量       | 投与日   |
|---------|-------------|-------|
| オブジーボ   | 480 mg/body | d1    |
| カボメティクス | 40 mg/body  | d1-28 |

## ニボルマブ(2週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名   | 推奨投与量       | 投与日 |
|-------|-------------|-----|
| オブジーボ | 240 mg/body | d1  |

## ニボルマブ(4週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名   | 推奨投与量       | 投与日 |
|-------|-------------|-----|
| オブジーボ | 480 mg/body | d1  |

## ペムブロリズマブ

催吐リスク: 1

適応疾患: 局所進行性腎細胞癌

投与スケジュール: 6週1コース(12ヶ月予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量  | 投与日 |
|--------|--------|-----|
| キイトルーダ | 400 mg | d1  |

## レンバチニブ+ペムブロリズマブ(3週1コース)

催吐リスク: 3

適応疾患: 進行・再発の腎細胞癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量  | 投与日   |
|--------|--------|-------|
| キイトルーダ | 200 mg | d1    |
| レンビマ   | 20 mg  | d1~21 |

## レンバチニブ+ペムブロリズマブ(6週1コース)

催吐リスク: 3

適応疾患: 進行・再発の腎細胞癌

投与スケジュール: 6週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

| 薬剤名    | 推奨投与量  | 投与日   |
|--------|--------|-------|
| キイトルーダ | 400 mg | d1    |
| レンビマ   | 20 mg  | d1~42 |

### 推奨投与量の単位

mg/m<sup>2</sup>:【体表面積】あたりの量      mg/kg:【体重】あたりの量  
AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

### 略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん  
SCLC: 小細胞肺がん  
PD: 病勢進行