



前立腺

カバジタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 前立腺がん(進行・再発)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ジェブタナ	25 mg/m <sup>2</sup>	d1

ダロルタミド+ADT+ドセタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 前立腺癌(転移性ホルモン感受性)

投与スケジュール: 3週1コース(6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	d1
ニューベクオ	1200 mg/body	d1-21

ドセタキセル

催吐リスク: 2

適応疾患: 前立腺がん

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	d1

推奨投与量の単位

mg/m<sup>2</sup>:【体表面積】あたりの量      mg/kg:【体重】あたりの量  
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC:非小細胞肺がん  
 SCLC:小細胞肺がん  
 PD:病勢進行