



悪性リンパ腫

CHOP療法

催吐リスク: 4

適応疾患: 悪性リンパ腫

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アドリアシン	50 mg/m ²	d1
エンドキサン	750 mg/m ²	d1
オンコピン	1.4 mg/m ²	d1
プレドニン	100 mg/body	d1~5

R-CHOP療法

催吐リスク: 3

適応疾患: CD20陽性悪性リンパ腫

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アドリアシン	50 mg/m ²	d3
エンドキサン	750 mg/m ²	d3
オンコピン	1.4 mg/m ²	d3
プレドニン	100 mg/body	d3~7
リツキサン	375 mg/m ²	d1

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
 AUC:カルバートの式により算出 ⇒投与量(mg/body)=AUC目標値×(GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺癌
 SCLC: 小細胞肺癌
 PD: 病勢進行