



縦隔

ADOC

催吐リスク: 4

適応疾患: 進行・再発の胸腺腫

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
エンドキサン	700 mg/m ²	d4
オンコビン	0.6 mg/m ²	d3
シスプラチン	50 mg/m ²	d1
ドキソルビン	40 mg/m ²	d1

PAC

催吐リスク: 4

適応疾患: 胸腺腫

投与スケジュール: 3週1コース(4コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
エンドキサン	500 mg/m ²	d1
シスプラチン	50 mg/m ²	d1
ドキソルビン	50 mg/m ²	d1

アテゾリズマブ《テセントリク併用レジメ終了後》

催吐リスク: 1

適応疾患: 胸腺癌

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
テセントリク	1200 mg/body	d1

カルボプラチン+パクリタキセル+アテゾリズマブ

催吐リスク: 3

適応疾患: 胸腺癌

投与スケジュール: 3週1コース(4~6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	6 AUC	d1
テセントリク	1200 mg/body	d1
パクリタキセル	200 mg/m ²	d1

パクリタキセル+カルボプラチン

催吐リスク: 3

適応疾患: 胸腺腫・胸腺癌

投与スケジュール: 3週1コース (3~6コース予定)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
カルボプラチン	6 AUC	d1
パクリタキセル	200 mg/m ²	d1

ペムトレキセド

催吐リスク: 2

適応疾患: 胸腺腫・胸腺癌 (進行・再発、一次治療不応例)

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
ペムトレキセド	500 mg/m ²	d1

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量

mg/kg:【体重】あたりの量

AUC:カルバートの式により算出 ⇒ 投与量(mg/body)=AUC目標値 × (GFR+25)

略語の意味

NSCLC:非小細胞肺癌

SCLC:小細胞肺癌

PD:病勢進行