



神経膠腫

テモゾロミド《再発1コース》

催吐リスク: 3

適応疾患: 悪性神経膠腫(再発1コース)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
テモダール	150 mg/m ²	d1~5

テモゾロミド《初発・放射線併用時》

催吐リスク: 3

適応疾患: 悪性神経膠腫(初発・放射線併用時)

投与スケジュール: 10週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
テモダール	75 mg/m ²	d1~42

テモゾロミド《放射線後、再発2コース以降》

催吐リスク: 3

適応疾患: 悪性神経膠腫(初発放射線照射後、再発2コース以降)

投与スケジュール: 4週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
テモダール	200 mg/m ²	d1~5

テモゾロミド+ベバシズマブ《維持期》

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性神経膠腫(初発)

投与スケジュール: 4週1コース (6コース)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アバステン	10 mg/kg	d1, 15
テモダール(内服)	150-200 mg/m ²	d1~5

テモゾロミド+ベバシズマブ《放射線同時照射期》

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性神経膠腫(初発)

投与スケジュール: 2週1コース (3コース)

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アバステン	10 mg/kg	d1
テモダール(内服)	75 mg/m ²	毎日

ベバシズマブ(2週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性神経膠腫(再発)

投与スケジュール: 2週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アバステン	10 mg/kg	d1

ベバシズマブ(3週1コース)

催吐リスク: 1

適応疾患: 悪性神経膠腫

投与スケジュール: 3週1コース

使用抗悪性腫瘍剤、推奨投与量、投与日

薬剤名	推奨投与量	投与日
アバステン	15 mg/kg	d1

推奨投与量の単位

mg/m²:【体表面積】あたりの量 mg/kg:【体重】あたりの量
AUC:カルバートの式により算出 ⇒ 投与量(mg/body)=AUC目標値 × (GFR+25)

略語の意味

NSCLC: 非小細胞肺がん
SCLC: 小細胞肺がん
PD: 病勢進行